This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Z
5352
.A437
M44

B 1,021,933

O. MATTIROLO

NOTE BIBLIOGRAFICHE ALLIONIANE

E

NOMENCLATOR ALLIONIANUS

PUBBLICATI

IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA CENTENARIA

DELLA MORTE DI CARLO ALLIONI

1804 — 1904

GENOVA

TIPOGRAFIA DI ANGELO CIMINAGO

Vico Mele 7, int. 5-6

1904.


1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

O. MATTIROLO

NOTE BIBLIOGRAFICHE ALLIONIANE

E

NOMENCLATOR ALLIONIANUS

PUBBLICATI

IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA CENTENARIA

DELLA MORTE DI CARLO ALLIONI

1804 — 1904

GENOVA

TIPOGRAFIA DI ANGELO CIMINAGO

Vico Mele 7, int. 5-6

1904.

Genève
Bot. Gardens
Chambésy
6.23-24
10253

3-11-27.ERW.

Il giorno 30 Luglio 1804 (1), serenamente, sì come visse, spegnevasi in Torino *Carlo Allioni.*

Si compiono adunque fra pochi giorni 100 anni da chè il *Linneo Piemontese* (2) lasciava nel lutto gli amici e gli ammiratori, affidando la memoria del suo nome ad un' opera poderosa e geniale, la quale ebbe, durante questi 100 anni, da tutto il mondo botanico, unanime, indiscusso, continuato tributo di lodi.

---

(1) Intorno al giorno di morte e a quello di nascita regnano discrepanze fra i biografi:

Così *Buniva* dice *Allioni* nato il 23 Settembre 1728; mentre *Bonino* lo ritiene nato il 3 Settembre dello stesso anno.

Come data della morte il *Buniva* segna il 31 Luglio; il *Bonino* il 30; il *Pritzel* invece il 28.

Queste discrepanze mi indussero a fare delle ricerche presso l'Ufficio di Stato civile della Città di Torino, dalle quali risultò essere *Carlo Allioni* morto alle ore 2 del giorno 30 Luglio (11 Termidoro dell'anno XII Repubblicano), nella casa al cantone XIX della Sezione *Monviso* segnata al N. 760, allora di proprietà *Castagneri,* oggi corrispondente alla Casa *Berardo e Borla* in Via Alfieri N. 10.

È curioso osservare che, mentre *l'atto legale del Municipio* segna 78 anni a Carlo Allioni, al momento della morte — *l'atto parrochiale* (che aveva allora maggior valore), in tutto conforme a quello conservato in Municipio segna anni 76, ciò che concorderebbe coi dati di *Buniva* e *Bonino. Allioni* fu sepolto in un *tombino a parte* al Cenotafio di Po (ora Ospedale di S. Lazzaro.

(2) BUNIVA, pag. 96, *assurément le Linné du Piemont ne fut pas moins heureux que celui de Suède....*

Egli è perciò cosa naturale che la gratitudine verso il padre della botanica in Piemonte, abbia fatto maturare ivi il pensiero di onorarne la memoria nella ricorrenza del giorno centenario della sua morte.

Un bronzeo ricordo che trasmettesse ai venturi l'effigie di *Carlo Allioni,* che ravvivasse il sentimento di riconoscenza verso di lui, è parso non dovesse mancare nel vecchio Orto botanico del Valentino, che *Allioni* illustrò; in mezzo ai semplici da lui studiati; di fronte ai colli Torinesi, campi delle sue glorie; al cospetto di quelle Alpi di cui egli svelò i tesori; di guisa che all'influenza esercitata dalla fama, dalle opere e dalle imprese di lui, si associasse quella, che per tramite dell'occhio si impone alla mente e richiama più efficacemente il pensiero alla persona.

L'immagine di *Carlo Allioni* avrà per l'Istituto botanico di Torino il valore che aveva presso i romani quella del « genius loci ». Per essa la generazione botanica attuale trasmetterà alle venture ringiovanito il culto per l'uomo, il quale, compendiando in poderosa opera sintetica tutto quanto prima di lui si conosceva intorno alla Flora del Piemonte, determinò nella storia della botanica subalpina una *epoca,* ponendo così le basi di un edificio scientifico, sulle quali edificarono i suoi allievi, edifichiamo noi, edificheranno i botanici delle generazioni venture.

Non è quindi a stupire se l'idea di fissare nel bronzo i lineamenti del nostro grande, quali ci furono conservati dal pennello di *Onorato Revelli* (1) abbia incontrato lieta accoglienza.

Uno fra i più notevoli e benemeriti studiosi della Flora piemontese, *E. Burnat* (2) associandosi con generosa offerta alla iniziativa del sottoscritto, gli permise di assecondare il nobile e disinteressato slancio del giovane e chiaro scultore signor *Ettore Ridoni;* il quale, col magistero del suo scalpello, seppe creare un'opera d'arte degna dei migliori elogi, sia per la rassomiglianza col ritratto del *Revelli,* come per la larghezza

---

(1) Per testimonianza di *Buniva* e di *Bonino,* sappiamo che il ritratto dipinto dal *Revelli* « *ne cessait d'être admiré par la ressemblance frappante* » — e notisi che il Buniva fu dell'Allioni affezionato discepolo. Vedi loc. cit. pag. 94 e V. presente lavoro p. 16.

(2) Il Sig. E. Burnat concorse con l'offerta di lire 200.

di modellatura e la vigoria colla quale svolse il suo concetto e illuminò la paterna figura di *Carlo Allioni*.

L'esecuzione in bronzo del busto fu quindi resa possibile dall'illuminato e munificente concorso (1) di S. M. il Re.

L'erede di Vittorio Amedeo III, al quale *Allioni* suo medico, aveva or è un secolo, dedicata la *Flora pedemontana*, implorandone l'altissimo patrocinio, volle che fosse conservata alla memoria di lui la generosa protezione che il munifico e dotto antenato aveva accordato in vita allo scienziato. Così il nostro giovane amatissimo Sovrano dimostrò di apprezzare il significato di una impresa colla quale si intende onorare con *Allioni*, la scienza di cui fu ministro.

Ricordando l'interessamento dell'illustre barone *Antonio Manno*, cortese interprete delle aspirazioni dell'Orto botanico di Torino presso S. M., ci è gradito dovere presentare a Re Vittorio Emanuele III le più vive e profonde azioni di grazie.

Nè con minor slancio fu accolta dai membri dell'Istituto botanico di Torino un'altra idea, quella cioè di onorare con la pubblicazione di un volume dedicato alla memoria di *Allioni* (2), lo scoprimento del ricordo monumentale.

In questo intendimento al sottoscritto si associarono:

La signora *Irene Chiapusso-Voli*, dettando una monografia storica sulla *Iconographia Taurinensis*; opera insigne che, dopo la *Flora*, rappresenta la principale (3) estrinsecazione dell'attività dell'*Allioni*;

---

(1) S. M. il Re inviava la somma di lire 200.

(2) Questo volume farà parte dell'annata 1904 della « Malpighia ». In questa occasione ringraziamo vivamente il Direttore dell'importante Rivista, Prof. *O. Penzig*, per la cortese sollecitudine colla quale accolse i nostri lavori.

(3) Approfitto di questa occasione per comunicare ai Colleghi botanici che la « *Iconographia* »; opera che costò 116 anni di lavoro a distintissimi artisti miniaturisti torinesi, fu in questi giorni « per disposizione Ministeriale » invocata dal sottoscritto, trasportata nei locali del R. Orto botanico, dove l'insigne monumento, *unico nel suo genere*, sarà conservato colla più religiosa cura, e dove potrà servire allo scopo per cui fu creato, allo studio cioè della Flora del Piemonte. In questa ricorrenza centenaria troveranno i botanici quasi tutti i cimeli allioniani riuniti nei locali dell'Istituto tori-

Saverio Belli già nostro collega a Torino, ora professore dell'Università di Cagliari, il quale, colla nota sua competenza, si occupò dei *Hieracium* dell'Erbario di *Allioni;*

Il dott. *Giuseppe Gola,* primo, Assistente presso l'Orto di Torino che illustrò due interessanti specie allioniane; la *Cerinthe maculata* All., ed il *Bromus dertonensis* All.;

Il dott. *Giovanni Negri,* secondo Assistente, che analizzò le questioni relative ad una delle specie allioniane più importanti, il *Cerastium lineare* All.;

Il dott. *Ferdinando Vignolo Lutati* che espose ricerche intorno alla *Pòa cilianensis* All.;

Il dott. *Francesco Ferrero* che ci favorì le negative per le tavole annesse al volume.

L'incarico di ricordare le odierne onoranze centenarie e quello di scrivere una relazione particolareggiata intorno alla bibliografia allioniana (1), di riferire cioè circa le fonti della letteratura che riguarda *Allioni,* fu assunto del sottoscritto, il quale pure compilò un « *Nomenclator* » destinato a ricordare le specie descritte dal maestro, le quali, *di diritto*, per la legge di priorità, devono essere conservate nella scienza.

Di proposito poi si è tralasciato di scrivere alcunchè intorno alla vita dell'*Allioni,* ciò parendo opera inutile dopo l'affettuoso monumento biografico già elevato alla memoria sua da *Michele Buniva,* l'allievo prediletto e riconoscente.

Infatti: della vita di *C. Allioni,* delle vicende della sua famiglia, della educazione scientifica, dei successi nell'Arte medica, del valore come uomo, delle tendenze filosofiche, dell'ingegno, trattò il *Buniva,* con tale competenza, tale intelletto d'amore, tale spontaneità affettuosa, che sarebbe stata opera vana affannarci a ripetere con altre parole quanto egli

---

nese, di cui *Allioni* fu, al dire di Buniva, *le veritable fondateur.* (V. Buniva, loc. cit. pag. 95).

(1) Ci è sembrato utile la rassegna bibliografica delle opere alioniane, poichè alcune di esse sono pochissimo note ai botanici, la maggior parte dei quali, suole giudicare del valore del nostro, dalla sola *Flora Pedemontana!*

seppe dire così onestamente, suscitando nell'animo del lettore, sincera profonda e riverente la simpatia verso l'*Allioni,* la cui vita tranquilla, serena, modesta fu tutta dedicata al culto della scienza e della famiglia e all'amore del prossimo; imperocchè *Allioni* non soltanto fu ammirato dai contemporanei per lo splendore dell'ingegno, per la molteplicità e profondità delle sue cognizioni, per la fortunata riuscita delle sue imprese mediche; ma ebbe fama di uomo esemplarmente virtuoso per la ingenua bontà, per la sua modestia, per la forza del carattere, per la generosità del cuore, per la costanza nelle amicizie.

Ed è appunto in omaggio al carattere, alle aspirazioni modeste di *Carlo Allioni,* che fu deciso di sciogliere il nostro voto, di inaugurare cioè la mattina del 30 Luglio il bronzeo ricordo senza vano sfoggio di pompe esteriori, senza rumori, senza discorsi.

Così la paterna figura del grande botanico piemontese ritornerà a sorridere nell'ambiente che fu già suo, ispiratrice oggi, come ieri, di elevati sentimenti, stimolatrice alle imprese nobili della scienza!

ORESTE MATTIROLO

Direttore del R. Orto botanico di Torino.

Giugno 1904.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

OPERE PUBBLICATE DA CARLO ALLIONI.

I.

OPERE BOTANICHE.

1. *Rariorum Pedemontii stirpium.* — Specimen primum. — Ap. Zappata et Avondus. Augustae Taurinorum. 1755. — (cum pp. 55, Tab. 12 et fig. 30, in IV).

2. *Stirpium praecipuarum littoris et agri Nicaensis.* — Enumeratio methodica cum Elencho aliquot animalium ejusdem maris. — Parisiis, apud Claudium Joannem Bapt. Bauche, 1757, in VIII.

3. *Fasciculus stirpium Sardiniae in Dioecesi Calaris lectarum a Michaele Antonio Plazza Chirurgo Taurinensi.* — in Miscellanea Philosophico-Mathemathica Societatis Privatae Taurinensis. Tom. I. Augustae Taurinorum. — Ex Typ. Regia, 1759, p. 88.

4. *Synopsis Methodica stirpium, Horti Taurinensis.* — Miscell. cit., vol. II, 1760-61, p. 48.

5. *Felicis Valle Taurinensis Florula Corsicae edita a C. Alliono.* 1760-61. — V. Miscell. cit. vol. II, p. 204.

6. *Stirpium aliquot descriptiones cum duorum novorum generum constitutione.* — V. Miscellanea cit. (seu Mélanges de Philosophie et de Mathématique de la Société Royale de Turin) Augustae Taurinorum. 1762-1765, p. 176-184.

7. *Auctarium ad Synopsim Methodicam Stirpium Horti Reg. Taurinensis.* — V. Miscellanea, Tom. V, p. 53 a 97. Ann. 1770-73.

8. *Flora Pedemontana.* Sive enumeratio Methodica Stirpium indigenarum Pedemontii. Augustae Taurinorum. Excudebat J. M. Briolus, 1785, Tom. I, II, III con 92 tavole in rame.

9. *Auctarium ad Floram Pedemontanam cun notis et emendationibus.* — Augustae Taur. J. M. Briolus. 1789, cum duobus Tab. aeneis.

II.

OPERE MEDICHE (1).

Themata Physica et Medica; De Firmitate, sive soliditate corporis; De Liene et Pancreate; De Respiratione; De Remediis e regno minerali petitis; De Mercurio; De Inflammationis exitu; De Abscessu; De Gangrena; De Scyrrho; De Carie. — Taurini, 1747, in-8°.

Tractatio de milliarium origine, progressu, natura et curatione. — Aug. Taurin. Apud Avondum. 1758, in-8°.

Tractatio de milliarium origine, progressu, natura et curatione. Notis et additionibus aucta. — August. Taurinorum. Fea, 1793, in-8°.

Ragionamento sopra la Pellagra, colla risposta al signor Dottore Gaetano Strambio. — Torino, Stamperia Reale, 1795.

Praelectiones inaugurales variae.

Conspectus praesentaneae morborum conditione. — Aug. Taur. 1793, Fea, in-8.°

III.

OPERE DI ZOOLOGIA.

Stirpium praecipuarum littoris et agri Nicaensis, ecc., cum Elencho aliquot animalium ejusdem maris. — Parisiis, J. B. Bauche, 1757. Appendix. pag. 243, ecc. loc. cit.

Manipulus insectorum Tauriniensium. — Miscell. Taur. loc. cit. Tom. III, p. 185.

IV.

OPERE DI PALEONTOLOGIA.

Oryctographiae Pedemontanae specimen, exhibens corpora fossilia terrae adventitia. — Parisiis, apud Bauche, 1757, in-8.°, pp. 82.

---

(1) V. Buniva e Bonino loc. cit.

OPERE MANOSCRITTE DI CARLO ALLIONI.

1.

Bibliographia Botanica sive De Scriptoribus medico-botanicis una cum Elencho operum quae ediderunt tum Loci tum temporis a

Laurentio Terraneo

Phil. et Med. Doct. Coleg. Taur. et Botanices

Professore collecta Anno 1714 — Aug. Taurin.

quam

Carolus Allionius Taurínensis

ulterius supplet et auget.

Questo mss. (quotato 1 — E — 1 . 4 —) che trovasi oggi nella Biblioteca della R. Accademia delle Scienze di Torino, costituisce uno dei sette volumi mss. dettati dal *Terraneo,* portanti il titolo « *de Re Herbaria* ». Lorenzo Terraneo (1), medico illustre, nacque in Torino nell'anno 1666 e vi morì il 4 Giugno 1714. Ebbe fama di anatomico valente, di medico oculatissimo, di fecondo oratore e latinista e di botanico insigne. Visitò in ogni parte il Piemonte raccogliendo ovunque materiali che servirono a costituire un ricco erbario di N.° 14 volumi in foglio. L'Erbario illustrato da note mss. fu da lui legato al suo allievo Dott. Massola, dal quale fu poi ceduto a Carlo Allioni.

Il mss. in questione consta di N. 610 pagine per la maggior parte non ancora scritte. Le note di Allioni vi sono assai numerose. Nel suo complesso quest'opera ricorda la nota *Bibliotheca botanica* di *Haller*. Pochissimi sono i botanici italiani ivi ricordati e ben poche notizie nuove vi si possono ricavare, le quali già non si trovino nell'*Isagoge di Tournefort*

(1) V. *Bonino* e *Buniva*, Biografie di Allioni cit. — *Allioni*, Flora Pedemontana, vol. I e Rariorum Ped. Stirp. Spec. I, 1760. — V. *Bonino*, (L. Terraneo), vol. II, p. 7. — *Gimna*, Notizia biografica con ritratto di L. Terraneo. — Accademia degli Spensierati di Napoli. — *Boërrhave, Haller, Bianchi*, ecc., ricordarono con onore il Terraneo. — V. *Mattirolo*, Illustrazione di un Erbario del colle di Superga - Torino. — Att. Acc. della Scienza, vol. XXVIII, 1893).

e nell'opera di *Haller*. Il mss. (ricordato anche dal *Buniva*) fu da lui donato all'Accademia per incarico del Dottore *Allioni* figlio, come egli dice a pag. 57 alla biografia di *Allioni*: « *je m'empresse de vous pre-* « *venir*, scrive egli infatti, *que conformement aux intentions de son* « *fils, j'ai mis ce manuscrit à la disposition de l'Académie, conjointement* « *à quelques autres*, **et notamment la collection de toute la correspon-** « **dance épistolaire de notre Allioni avec les plus grands naturalistes** « **de son temps, comme Linné, Haller e Spallanzani, ecc.** ».

Nella « *Flora Pedemontana* » di Allioni sono ricordate N.° 56 specie raccolte da *L. Terraneo*, il quale si dichiara allievo riconoscente e grato di *Bertolotti* o *Bartolotti Ignazio Pompeo* Dottore di fisica e chimica, Medico Collegiato, citato onorevolmente da *Paolo Boccone* nel suo *Museo* (pag. 83). *Bartolotti* fiorì nel XVII secolo in Piemonte ed il suo nome è pure ricordato nella *Flora* allioniana; fu il maestro di *Lorenzo Terraneo*.

2.

Materia medica. — Un vol. mss. (R. Accademia delle Scienze di Torino). — Intorno a questo lavoro diviso in tre parti; di cui la prima tratta dei rimedi che si ricavano dal regno animale; la seconda si occupa delle piante officinali, e la terza dei rimedi minerali, scrisse il Buniva a pag. 60 et seg. del suo lavoro le seguenti parole: *Dans ces trois parties on trouve bien des réflexions, qui parurent ensuite dans les ouvrages analogues publiés par Linné, Crantz, Spielmann, Vogel, Lieutaud*, ecc.

3.

Paranesis. — Studiorum meorum primitias.

Questo manoscritto che portava la data del 1750, trattava di un *plagio* di cui fu vittima un amico caro di *Allioni*, il Dottore *Valle Felice Spirito* discepolo di *Vitaliano Donati*; botanico, troppo presto rapito alla scienza, poichè morì in Ajaccio nell'Agosto dell'anno 1747, essendo nato [1] circa il 1715, cioè a circa soli 32 anni!

---

[1] La data di nascita è incerta. Dalle ricerche da me fatte negli Archivi Universitari, risulta che il *Valle* fu laureato medico il 22 Maggio 1743; da

Il *Valle* oltre alla Tesi per l'aggregazione alla Facoltà medica, stampata a Torino nell'anno 1743 (V. Bonino, loc. cit., vol. II, p. 131), aveva lasciato, morendo, alcuni mss. tra i quali uno studio dal titolo: « *Dissertatio de Sexu plantarum* ».

Avvenuta la morte del *Valle* in Ajaccio, una persona indegna del nome di amico, si impadroniva fraudolentemente del mss. da lui lasciato a Torino, e dopo tre anni dalla morte del *Valle,* lo stampava sotto il suo nome a Milano nel 1750; ragione per cui il nome di *G. M. Schiera,* invece di quello del povero *Valle,* venne poi, per questo lavoro, onorevolmente indicato tanto dal *Linneo* (V. Philos. bot., edit. 1751, p. 308) come dallo *Sprengel* (V. Hist. Rei Herb., Tom. II, 1808, pag. 546).

Il mss. di *Allioni* che si occupava della storia di questo *plagio,* alla morte di *Allioni,* passò in Germania, dove fu rinvenuto e acquistato nella vendita della biblioteca botanica del *Mejer,* dal cav. *Maurizio Zumaglini* di Biella, che lo tenne come prezioso cimelio.

Morto il *Zumaglini* (14 Novembre 1865) il mss. scomparve, cosicchè non mi fu dato più di rinvenirlo fra i libri suoi pure rimasti a Biella. Fortunatamente però nello stesso anno il mss. in discorso veniva studiato diligentemente dal Prof. *Augusto Gras,* il quale se ne occupava in una briosa e interessante pubblicazione comparsa nella « *Gazzetta medica di Torino* » dell'anno 1866, sotto il titolo: « *Storia di un plagio letterario* » dalla quale ho tolto queste notizie.

È gran peccato che la « *Paranesis* » non si sia potuta ritrovare più fra i libri del *Zumaglini;* poichè (da quanto si può rilevare dallo scritto del *Gras*) costituiva una splendida testimonianza per le elevate e nobilissime qualità di carattere di *Carlo Allioni,* il quale seppe, malgrado gravi difficoltà, difendere e rivendicare all'amico il merito del suo lavoro, smascherando e flagellando la malvagità e l'impostura del falso amico.

Parlando del *Valle,* aggiungerò che questo botanico nel corso di una brevissima esistenza, seppe raccogliere una ricchissima biblioteca e mettere insieme ragguardevoli collezioni, e scrivere numerosi lavori che però rimasero mss. e andarono poi perduti.

---

molti altri indizii giudico che il *Valle* sia nato negli anni che decorrono fra il 1715 e il 1720.

Buona parte delle Collezioni, specialmente quelle fatte nella Valle di Susa (Oulx) ed in Corsica pervennero nelle mani di *Allioni*. Delle prime è cenno in varii luoghi della « *Flora Pedemontana* »; delle seconde si servì Allioni per comporre la « *Florula Corsica* ». (V. *O. Mattirolo*, Sopra un Erbario del Colle di Superga, loc. cit. e *Bonino*, loc. cit., vol. II, pag. 131).

4.

Intorno alla conoscenza del Polso, N. 84, note mss.

Si sa che queste note nell' anno 1810 erano nelle mani del *Buniva*, che aveva preso impegno di pubblicarle: « *que je m'engage à publier avec le forme convenable* » (V. *Buniva,* Refléx., loc. cit., p. 53). Oltre a questi mss. intorno alla conoscenza del polso, raccolti dal figlio di *Allioni,* medico pur esso, esisteva ancora un mss. completo intorno alle conoscenze della sfigmografia. Questo mss. che il Buniva dice aver veduto « *de ses propres jeux chez l'Auteur* » (*Allioni*), non fu pubblicato poi; ciò che il *Buniva* lamenta colle parole seguenti, sfiduciato: « *qu'on priva l'humanité d'une production si utile à la Société et souhaitée si ardemment par les vieux connaisseurs* ». Malgrado le più minuziose ricerche io non ho potuto riescire a rintracciare questi due mss.

5.

Coi mss. devono essere considerati i N. 20 volumi di lettere che rappresentano la corrispondenza epistolare di *Allioni,* coi più grandi naturalisti del suo tempo. In questi volumi, conservati oggi nella Biblioteca della R. Accademia delle Scienze, dove furono depositati dal *Buniva,* per incarico del figlio di *Allioni* (V. *Buniva,* loc. cit.) [1], si trovano lettere, tra le altre, di *Cirillo,* di *DeJussieu*, di *Ferber*, *Fabricius, Gessner, Gouan, Haller, Jacquin, Linné, LaPeyrouse, Loefing, Marsili, Manetti, Maratti, Ortega, Scopoli, Scheutzer, Spallanzani, O. Targioni Tozzetti, Vic d'Azyr, Vandelli, Villars, Volta, Zannoni, Zuccagni,* ecc. Alcune di esse già furono pubblicate da *Augusto Gras* (Lettere di *Linneo, Jussieu, Villars, Lapeyrouse, Bassi,* ecc.); di molte sta ora occupandosi lo scri-

[1] V. pag. 11.

vente, il quale spera di trovarvi non poche interessanti notizie intorno ai rapporti fra gli scienziati italiani che fiorivano verso la fine del XVIII Secolo.

L'Accademia è in possesso di questo materiale sino dal 1810 circa.

Oltre a questi 20 volumi, dobbiamo ricordare pure: un piccolo llibriccino che contiene una lettera sola, scritta da *Allioni al sig. Ferdinando Bassi intorno a vari corpi marini fossili trovati in Piemonte, Monferrato,* ecc., vol. mss. in IV; ed un altro volume grande contenente numerosi diplomi Accademici, dei quali è fatto cenno nella biografia del *Buniva.*

6.

Oltre ai mss. citati, esiste nella Biblioteca Municipale di Biella (Scuola Professionale) un volume di 419 pagine di fitta scrittura (dono di *Venanzio Sella*) il quale porta l'indicazione seguente:

« *è scritto di pugno di Allioni dopo il 1755* ; e mezzo cancellato il nome *Piotta.*

Sul dorso del volume, oltre al N. 238 di posizione. è scritto:

« *Flora - Manoscritto di Allioni? di Piottaz* ».

Nel mss. sono brevemente indicati N. 621 generi di piante e di questi sono elencate le specie più note, coi loro caratteri e con citazioni bibliografiche varie. Sono ricordate piante di tutti i climi.

A me è parso che questo non sia da riguardarsi come mss. del maestro, (alla scrittura del quale non corrisponde); ma come una compilazione fatta dal noto *Francesço Piottaz,* che fu Conservatore presso il R. Orto botanico e morì nel 1822. Certamente questo mss., che doveva servire per uso pratico di orticoltura, nulla contiene di notevole dal punto di vista scientifico.

PRINCIPALI BIOGRAFIE DI CARLO ALLIONI.

1. *M. Buniva,* Réflexions sur tous les Ouvrages publiès et inedits du D. Ch. Allioni. — Turin, F. Galletti, 1810.

2. *G. Bonino,* Biografia Medica Piemontese, vol. II, 1825, p. 433-450. Allioni Carlo.

3. *Racagni,* Memorie sulla famiglia e sulla vita di Carlo Allioni. — Carmagnola, 1806.

4. *Gensana,* Elogio di Carlo Allioni. — Ape Subalpina, Giugno, 1811.

5. *Paroletti,* Vita e ritratti di sessanta Piemontesi illustri. — Torino, Lit. Festa, 1824.

6. *Du Petit-Thouars* in Biographie Universelle, vol. II, pag. 189.

7. *G. A.,* Biografia di Carlo Allioni. — Torino, Sotteri, 1845, in-4°.

OPERE PRINCIPALI

nelle quali si incontrano notizie biografiche di CARLO ALLIONI.

M. Buniva, Nomenclator Linneanus Florae Pedemontanae. — Taurin., Typ. Regia, 1790.

E. Burnat, Botanistes qui ont contribué à faire connaitre la Flore des Alpes maritimes (Bibliographie et Collections botaniques). Bull. Soc. botaniq. Franc., 1883.

E. Burnat, Flore des Alpes maritimes. Vol. I, 1892, Vol. II, 1896, Vol. III, 1899.

G. B. Delponte, Il R. Orto botanico di Torino. Nel « *Mondo Illustrato,* Giornale Universale. — Torino, G. Pomba Editori, Anno II, N. 51 e 52. Dicembre 1848, con illustrazioni.

G. B. Delponte, Guida allo studio delle piante coltivate nelle aiuole di piena terra. Cenno preliminare. C. Allioni, p. IX, XIII, 1874.

Ferber, Lettere miner. italiane, p. 465. Briefe aus Welschland. — Praga, 1773.

A. Gras, Corréspondance inédite de Villars avec Allioni. — Bull. Soc. bot. de France, 1860.

A. Gras, Note sur la Cardamine granulosa. — Bull. Soc. bot. de France, 1861.

A. Gras, Note sur quelques rectifications de Synonymie. — Bull. Soc. bot. Franc., 1861.

A. Gras, Nouvelles notes sur quelques rectifications de Synonymie. — Bull. Soc. bot. de France, 1863.

A. Gras, Note sur l'Histoire du Genre Bassia. — Bull. Soc. bot. de France, 1864.

A. Gras, Sur la corréspondance inédite de Lapeyrouse avec Allioni. — Bull. Soc. bot. Franc., 1864.

A. Gras, Storia di un plagio letterario. Gazzetta medica di Torino, 1866.

O. Mattirolo, Illustrazione di un Erbario del Colle di Superga. Torino, 1893. — Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, vol. XXVIII.

G. A. Pritzel, Thesaurus literaturae Botanicae. Lipsia, 1872, p. 4.

P. A. Saccardo, La Botanica in Italia, vol. I, 1895, vol. II, 1901. Venezia.

Prefazioni varie e notizie incidentalmente segnate nelle opere di *Dana, Bellardi, Balbis, Colla, Biroli, Moris, Mattirolo,* ecc., ecc.

RITRATTI E DEDICHE CHE RICORDANO CARLO ALLIONI.

1.

Ritratto eseguito dal Prof. *Onorato Revelli* dell'Accademia di Belle Arti di Torino dietro ordine del conte *Balbo*, Rettore dell'Accademia stessa, e per decreto del Collegio medico Torinese (V. *Bonino*). Rappresenta *Allioni* seduto sopra un seggiolone di velluto rosso, vestito della tradizionale toga professionale, colla parrucca bianca. Colla destra mano il Professore indica la *Flora Pedemontana*, aperta sopra un vicino tavolo e riproducente parte della Tav. XXV e XLVII di quest'opera; la mano sinistra appoggiata al bracciale del seggiolone tiene una pianticella di *Allionia incarnata*. Lo sfondo rappresenta il gabinetto di Allioni. Il ritratto grande al vero, toccato con maestria, è opera d'arte di qualche valore. Questo quadro per lungo tempo fu appeso in una delle sale dell'Università; con molti altri passò poi nei magazzini, ove ebbi la ventura di ritrovarlo nell'anno 1890. Ora si conserva nel salone dell'Erbario dell'Orto botanico torinese. Il *Bonino* ed il *Buniva* ragionano a lungo di questo quadro nelle Biografie del

Maestro dicendo il Buniva che l'opera del Revelli: *ne cesse d'être admirée par la ressemblance frappante, et par la vivacité du coloris* (1). A questo ritratto si è inspirato l'artista signor *Ettore Ridoni* per modellare il busto di Allioni (V. Tavole VI e VII).

2.

Acquerello nella Collezione di ritratti botanici nell'Istituto botanico di Bologna (V. *Saccardo,* loc. cit.).

3.

Ritratto in litografia del Festa di Torino; in Paroletti, Vite e ritratti di sessanta Piemontesi illustri. Torino, 1824 (loc. cit.).

4.

Medaglione in gesso sopra i Portici della casa Flandinet in via Bogino, N. 45, Torino. — Opera dello Scultore *Bogliani.*

5.

Col nome di *Carlo Allioni* la Città di Torino onorò una delle sue vie, a destra della Piazza dello Statuto. (Deliberazione Consigliare, 28 Aprile 1852).

6.

Linneo indicò col nome di Allioni un Genere di piante Nictagineae. — *Fabricius* e *Prunner* diedero il suo nome a due specie di farfalle rispettivamente dei Generi *Pyralis* e *Phalaena* (V. *Bonino,* pag. 447 e *Buniva*). — Molti botanici ricordarono il nome di Allioni e noi abbiamo nel « *Nomenclator* », che fa seguito alla presente nota, ricordate N. 38 specie che portano il nome di Allioni (V. pag. 76).

---

(1) V. loc. cit. pag. 94.

NOMENCLATOR ALLIONIANUS

SIVE INDEX SPECIERUM CAROLO ALLIONIO ADSCRIPTARUM

(Elenco delle specie attribuite a C. Allioni)

Auctore Doct. O. MATTIROLO

Bot. Prof. et R. Horti bot. Taurinensis Praefectus

adjuvante E. FERRARI

Conservatore R. Horti bot. Taurinensis

Determinare dopo circa 120 anni dalla pubblicazione della « *Flora Pedemontana* » (1785), quali sieno i nomi delle Specie ivi ricordate, aventi il diritto di essere conservate nella Scienza, è il compito del lavoro che io mi onoro di presentare ai Colleghi botanici in occasione della prima ricorrenza centenaria dalla morte di CARLO ALLIONI, (30 Luglio 1904).

Ho lavorato nell'intento di compiere una statistica il più possibile esatta, la quale, mentre vale a dare una idea della mole degli studi fatti dal nostro ALLIONI, serve ad indicare quanto deve rimanere di lui nella scienza che ha riguardo alla sistemazione dei vegetali.

Convinto di fare un'opera pratica, nell'imminente periodo di tempo il quale preludia, per così dire, all'adozione indispensabile di nuovi criterii di nomenclatura, atti a disciplinare il vastissimo ed intricato problema della sinonimia; ho cercato di condurre le ricerche col criterio della più equa imparzialità, vagliando con meticolosa cura, le ragioni di priorità dalle quali unicamente mi sono lasciato guidare nella scelta dei nomi hanno il diritto di essere conservati.

Nel lungo lavoro mi fu di prezioso aiuto la collaborazione efficace del Sig. ENRICO FERRARI, conservatore dell'Orto Botanico di Torino, col quale ebbi cura di esaminare tutte le opere allioniane, ponendo speciale attenzione a quelle anteriori alla *Flora Pedemontana*, (poco note oggi an-

cora ai botanici sistematici, rimaste quasi sconosciute al LINNEO (1), le quali ci servirono a correggere non pochi errati apprezzamenti di sinonimia, adottati successivamente nelle Flore.

Il presente lavoro certo non ha pretesa di essere un codice infallibile! Infatti: per quanto si sia cercato da noi di procedere cautamente e onestamente; si siano ponderate le conclusioni; si sia proceduto coi paragoni nell'Erbario; col sussidio dei testi redatti dai più stimati monografi; pure siamo convinti, che, malgrado il nostro buon volere, la nostra diligenza e il nostro amore, molto rimarrà ancora a farsi per avere opera perfetta e degna dell'immortale illustratore della Flora piemontese.

Chi si è provato in lavori di sistematica, può valutare da una parte l'enorme difficoltà del tema che ci siamo proposti, e dall'altra può giustamente apprezzare la vastità dei confini dell'opera condotta a termine da CARLO ALLIONI, la quale perciò appunto non potè riescire in tutto l'organismo suo perfetta e sana, scevra di dubbii e di confusioni.

Notisi che i rapporti personali od epistolari, la comunicazione di materiali, erano assai difficili fra i botanici del Secolo XVIII; che allora i libri erano assai scarsi e rari, massime quelli illustrati; condizioni queste che contribuirono a creare molte delle intricate questioni che abbiamo tentato di sviscerare; ma che non abbiamo potuto sempre decidere; obbligati ad arrestarci nelle nostre indagini di fronte alla confusione in cui si trova il materiale dell'Erbario Allioniano; il quale risente purtroppo del disordine di cui per parecchio tempo ebbe a soffrire, quando giacque incustodito nei locali dell'Orto della Reale Accademia di Agricultura.

---

(1) Come risulta dalle seguenti frasi contenute in una lettera di Linneo ad Allioni (31 Marzo 1772).

Linneo infatti scrive: *Loqueris de Synopsis methodica Stirpium H. B. T., de libro a me nunquam audito; perscribas mihi titulum. Libri botanici ex Italia nunquam apud nos occurrunt, ut, si ipse mihi eos gratiosissime non dedisses, nunquam iis frui mihi contigisset. Grates reddo similiter pro Auctario quod die noctеque avidissime desidero. Utinam hoc obtinerem antequam ederem novam editionem tomi secundi Systematis, quam nunc paro precibus typographi.....* Queste frasi furono già riferite da A. GRAS., *Bull. Soc. bot. de France 1861.* Intorno alle lettere dirette dai più illustri contemporanei a *Carlo Allioni* V. O. Mattirolo nel lavoro che precede.

In questo Erbario, (come fu trasmesso all'Orto botanico [1]), molte volte le piante non corrispondono alle descrizioni della *Flora;* indicate col medesimo nome, (e nella stessa camicia), si trovano, e non se ne capisce il perchè, specie assai differenti, quali ALLIONI non avrebbe mai potuto confondere! [2].

Riscontrare tutte le piante raccolte nell'Erbario colle descrizioni della *Flora* sarebbe stata opera quasi impossibile, ma nello stesso tempo inutile, per le suesposte ragioni; epperò, nei casi difficili, ci siamo tenuti alle descrizioni ed ai lavori; alle indicazioni; agli Erbari dei suoi amici, dei contemporanei e dei successori diretti, quali BELLARDI, BALBIS, COLLA, RE, MORIS, ecc.; o alle opinioni dei più valenti monografi.

Il presente *Nomenclator* fu così compilato:

Si esaminarono dapprima tutte le opere di ALLIONI; quelle dei suoi accuratissimi biografi; il *Nomenclator Linneanus Florae Pedemontanae* del Buniva, il *Nomenclator* di Steudel, quello di Salomon per le Crittogame vascolari, l'*Index Kewensis* ecc., nonchè le *Species Plantarum* di Linneo; e col materiale raccolto si formulò un primo catalogo di nomi attribuiti ad ALLIONI. Si passò quindi all'esame delle principali Flore fra le quali ricorderemo quelle di: ARCANGELI — ARDOINO — ASCHERSON — BERTOLONI — BURNAT — CESATI, PASSERINI e GIBELLI — COLLA — DE CANDOLLE — FIORI — GAUDIN — GRÉNIER ET GODRON — KOCH — MORIS — PARLATORE — SCOPOLI — VILLARS — ZUMAGLINI ecc.

Si ricorse alle Monografie più stimate fra quelle le quali hanno riguardo alla vegetazione del Piemonte [3]; ai lavori di *tutti* i principali

---

(1) *Intorno all'Erbario di Allioni,* v. MATTIROLO, *Illustrazione di un Erbario del Colle di Superga.* — Atti della R. Acc. delle Scienze di Torino. Vol. XXVIII, 1893.

(2) Chi avesse interesse a conoscere le *condizioni presenti* dell'*Erbario Allioni*; che avrebbe potuto esserci trasmesso come un vero monumento scientifico, veda quanto in proposito scrissero PARLATORE, BURNAT e nel presente volume il BELLI a proposito del Gen. Hieracium da lui studiato nell'Erbario allioniano.

(3) Ricorderemo per il Gen. *Hieracium* le Monografie di BURNAT, BELLI, ARVET TOUVET; per il Gen. *Rosa* i lavori di CREPIN e di BURNAT; per le *Primule* la Monografia della Signorina WIDMER, per i gen. *Centaurea* e

botanici piemontesi allievi o successori di Allioni; ai lavori che trattano speciali questioni di sinonimia allioniana, come quelli di A. GRAS e di alcuni botanici francesi, pubblicati nei Bollettini delle Società botaniche ecc.; e col materiale raccolto nella lunga revisione, si compilò il catalogo definitivo, lo studio accurato del quale, ci ha portati alla redazione del presente *Nomenclator,* nel quale speriamo di aver raccolto tutti i nomi attribuiti a CARLO ALLIONI.

Ricordiamo che ad ogni nome di specie attribuita ad Allioni, viene a corrispondere quello che (secondo il nostro giudizio, informato ai criteri sopra esposti) deve essere oggi adottato, in omaggio alla « *legge di priorità* » intesa col criterio del buon senso scientifico.

Le specie allioniane, le *quali si debbono conservare,* vennero indicate con carattere tipografico speciale e per ciascuna di esse è segnata l'opera nella quale fu primieramente descritta e l'anno in cui fu dall'ALLIONI indicata colla nomenclatura binomia.

In questo modo, ordinato il materiale in serie alfabetica, riescirà facile a chiunque farsi un concetto esatto del nome col quale ogni singola specie deve essere indicata; avendo sempre riguardo di adottare l'ultimo di essi.

Licenziamo questo *Nomenclator* dell'opera allioniana, al quale abbiamo atteso con amore, nella speranza che esso possa tornare utile a chi desidera prontamente orientarsi nel lavoro preparatorio, destinato a servir di base alle estese ricerche sistematiche, risparmiandosi così il tempo e le fatiche delle prime indagini bibliografiche non sempre facili o possibili.

Torino, Maggio 1904.

O. MATTIROLO.

Mentha, le Monografie di BRIQUET; per il gen. *Trifolium* quella di GIBELLI e BELLI ecc.

NOMENCLATOR ALLIONIANUS [1].

A. — Specierum nomina *repudianda* (nam eaedem species a botanicis preallionianis antea rite descriptae sunt), formis litterarum consuetis indicata sunt. Nomen extremum semper retinendum.

B. — Specierum nomina *servanda* (quae plantas ab Allionio primum descriptas indicant) formis litterarum *specialibus* ornavimus.

C. — Asterisco notata sunt nomina specierum plantarum exoticarum.

GENERA ALLIONIANA.

Alectorolophus (Haller) Allioni F. P. I, 58.
Androsaemum (Tournefort) Allioni F. P. II, 47.
Bassia All. Miscell. Taurin. vol. III, 1765.
= Salsola L. = Kochia Roth.
= Echinopsilon Moquin Tandon.
Bellardia All. F. P. I, 60.
= Bartsia L.
= Trixago Link.
Brachiolobos All. F. P. I, 278.
= Sisymbrium L. p. p.
= Nasturtium R. Brown p. p.
= Roripa Besser p. p.
Buceras All. F. P. I, 313.
= Trigonella L. Sp. P. 776.
Danaa All. F. P. II, 34.
= Physospermum Cuss. 1782. Mém. Soc. med. Paris p. 279.
Fosselinia All. F. P. I, 246.
= Clypeola L.

---

[1] F. P. = *Flora Pedemontana* — le altre abbreviazioni si riferiscono alle opere allioniane precedentemente ricordate nella parte bibliografica. S. P. indica = Linné. *Species Plantarum* edit. 1.ª 1753.

Lindernia All. vol. III Miscell. Taur. Stirpium aliquot descript. p. 178 (1762-65).

Rorella All. F. P. II, 88.

= Drosera L.

Thymelaea (Tourn) All. F. P. I, 131.

SPECIES ALLIONIANAE.

A.

Acarna cancellata All. F. P. I, 153.

= Atractylis cancellata L. S. P. 830.

Achillea Herba-Rota All. Spec. Ped. pag. 12, Auct. ad Synop. p. 69, N. 62, Tab. II — All. F. P. I, 180 — Tab. 9, fig. 3.

= Ptarmica herba rota DC. Prodr. VI, 22.

Achillea ligustica All. Auct. ad Synop. p. 69 N. 63 — All. F. P. I, 181 Tab. 53, fig. 2.

= Achillea Sicula Rafin. (1814).

Achillea magna All. F. P. I, 184, Tab. 53, fig. 1.

= Achillea tanacetifolia All. F. P. I, 183 v. dentifera Koch. Flor. Germ. 320.

Achillea tanacetifolia All. F. P. I, 183.

Achyranthes sicula All. Auct. ad Synop. 1770-73 p. 93 N. 138.

= Achyranthes aspera L. Sicula, L. S. P. p. 204.

= Achyranthes argentea Lam. Dict. encyclop. I (1783).

= Achyranthes sicula Roth. Cat. bot. I, p. 39 (1797). V. A. Gras. Nouvelles notes sur quelques Rectifications de Synonymie, Bull. Soc. bot. Franç. 1863.

Aconitum cammarum All. F. P. II, 62.

= Aconitum paniculatum Lam. Flor. franc. edit. I, p. 33 (1778).

Agrostis aculeata All. (Scop.) F. P. II, 237.

= Schoenus aculeatus L. S. P. 42.

= Crypsis aculeata Ait. Hort. Kew. edit. I, 48 (1789).

Agrostis alpina Scop. β. *aurata* All. in Arcangeli ed. I, p. 770 et Cesati Pass. et Gib. pag. 53.

= Avena aurata All. F. P. II, 255.

Agrostis pungens All. F. P. II, 237.

= Sporolobus pungens Kunt. Rev. Gram. 1. 68, 1829.

= Sporolobus arenarius Duval-Jouve. Bull. Soc. bot. Franç. XVI 1869.

Agrostis rupestris All. F. P. II, 237.

= Agrostis setacea Vill. Hist. de Plant. Dauph. II, 76.

Aira valesiana All. Auct. p. 40.

= Koeleria valesiaca Gaud. (1811).

= Koeleria Vallesiana Asch. et Graebn. Synop. vol. II, p. 354.

Alectorolophus glaber All. F. P. I, 58.

= Rhinanthus minor Ehr. Beiträg. 6. 144 (1791).

Alectorolophus hirsutus All. F. P. I, 58.

= Rhinanthus Alectorolophus Pollich.Hist. plant. Palat. II, 177 (1776-77).

Alisma ranunculoides All. F. P. I, 234.

= Alisma plantago L. S. P. 342.

Allium carinatum All. F. P. II, 156.

= Allium carinatum L. S. P. 426, ed. II. V. Cesati Pass. Gib. Compendio, p. 141, Not. 1.

Allium nigrum All. F. P. II, 158, Tav. 25, fig. 1.

= Allium Narcissiflorum Vill. Prosp. p. 18, N. 19.

Alopecurus ciliatus All. F. P. II, 235.

= Koeleria phleoides Pers. (Sec. Index Kew.; manca l'esemplare nell'Erbario Allioni).

Alopecurus litoreus All. F. P. II, 235.

= Koeleria villosa Pers.

= Koeleria pubescens P. d. B. (V. Parlat. F. Ital. p. 319, vol. I).

Alyssum argenteum All. in Auct. ad Synop. (1770-73) p. 73, N. 79.

= Lunaria argentea All. F. P. I, p. 245, Tab. 54, fig. 3.

= Alyssum argenteum Vittman Summ. vol. IV, p. 30, 1790! (V. Gras. Rectificat. de Syn. ecc. loc. cit. 1861 et Gras. — in Delponte, Guida allo studio delle Piante coltivate nel R. Orto botanico di di Torino, Torino 1874, pag. XI).

Alyssum myagrodes All. F. P. I, 241.

= Cochlearia saxatilis L. S. P. 648.
= Kernera saxatilis Rchb.

Amaranthus viridis All. F. P. II, 218.
= Amaranthus sylvestris Desf. Cat. 44, 1829).

***Ambrosia Peruviana** All. Auct. ad Synop. (1770-73) pag. 67, N. 54.
= Ambrosia peruviana Wild. Sp. Plant. vol. IV, p. 377 (1805).
V. A. Gras, Nouvelles notes sur quelques rectifications de Synonymie. Bull. Soc. bot. Franç. 1863.

Anagallis coerulea All. F. P. I, 87.
= Anagallis arvensis L. S. P. 148 v. coerulea Aut.

Anagallis phoenicea All. F. P. I, 87.
= Anagallis arvensis L. S. P. 148. (v. phoenicea Aut.).

Anagallis verticillata All. F. P. I, 87, Tab. 85, fig. 4.
= Anagallis arvensis L. S. P. 148 (varietas coerulea).

Andropogon contortum All. F. P. II, 260, Tab. 91, fig. 4.
= Andropogon contortum L. S. P. 1045.
= Andropogon Allionii Lamk. (1805).
= Heteropogon Allionii Roemer et Schultz. (1817).

Androsace helvetica All. F. P. I, 91.
= Diapensia helvetica L. S. P. 141.
= Androsace bryoides DC.
= Androsace helvetica Gaud. (1828).

Androsace obtusifolia All. Specimen. p. 22, Tab. IV, fig. 2 et All. F. P. I, 90, Tab. 46, fig. 1.
= Androsace lactea Vill. Pl. Dauph. 2. 476 (non L.).

Androsaemum officinale All. F. P. II, 47.
= Hypericum Androsaemum L. S. P. ed. II, p. 1102.

Anemone Halleri All. Auct. ad Synops. p. 92 (134). — All. F. P. II, 170 Tab. 8, fig. 2.
= Pulsatilla Halleri Spr.

Anemone hortensis All. F. P. II, 172 et Herb.
= Anemone hortensis L. var. α stellata Gren. Godr. Flor. Franc. (v. Burnat. loc. cit. vol. 1, pag. 13).

Anemone sulphurea All. F. P. II, 170.

= Anemone vernalis L. S. P. 538.

Angelica levisticum All. F. P. II, 10.

= Ligusticum Levisticum L. S. P. 250.

= Levisticum officinale Koch.

Angelica Razulii All. F. P. II, 10.

= Angelica sylvestris L. S. P. 251 (var.).

Anthemis Triunfetti All. Questa specie venne pubblicata dall'Allioni nella Flora (vol. I, pag. 187) col nome di *Chamaemelum Triunfetti* N. — Giova avvertire però, che ivi egli ricorda il nome di *Anthemis Triunfetti* N. appoggiandolo ad una citazione errata — *Misc. Taur.* seguita dalle parole seguenti: *Ab Anthemi tinctoria distinxi.* Ora per quanto abbiamo cercato in tutti gli scritti di Allioni, non ci fu dato trovare menzione di questo nome, e solo trovammo ricordata (Miscell. Taur. vol. II, Synop. Method. p. 59) una *Anthemis tinctoria.* Notisi che la citazione della Flora, non porta indicazione di pagina. Sec. Grénier et Godron (1844) questa specie che crediamo doversi ritenere come specie allioniana sarebbe sinonima della *Cota Triunfetti* Gay. in Guss. Syn. 2 Part. 2 p. 867.

Antirrhinum origanifolium All. Auct. p. 5.

= Linaria origanifolia DC. Flor. frac. III, p. 591 (1805).

Aparine minima All. Stirp. precip. litt. et Agri Nicaensis, Paris 1757, pag. 4.

= Galium murale All. F. P. I, 8, Tab. 77, fig. 1.

Aquilegia viscosa All. F. P. II, 64.

= Aquilegia Reuteri Boiss. Diagn. Plant. or. vol. III, serie II, fasc. I, p. 10 (anno 1854). (V. Burnat loc. cit. pag. 47, vol. 1).

Arabis aspera All. Auct. 18, N. 973, Tab. II, fig. 2.

= Arabis auriculata Lam. Encycl. I, 219 (1783).

Arabis coerulea All. Auct. ad Synop. Stirp. (1770-73). pag. 74, N. 82.

= Turritis coerulea All. F. P. I, 270, Tab. 40, fig. 2.

= Arabis coerulea Haencke in Jacq. Collect. ad bot. II (anno 1788). V. Gras., Rectificatios ecc. loc. cit. 1861.

Arabis saxatilis All. F. P. I, 268.

= Arabis nova Vill. Prosp. p. 39 (1779). V. Gras et Burnat loc. cit.

Arabis scabra All. F. P. I, 268 et Auct. F. P. p. 18.

= Arabis serpyllifolia Vill. Prosp. p. 39. (V. Burnat. loc. cit. vol. I, pag. 96).

Arenaria austriaca All. F. P. II, 112, Tab. 64, fig. 2.

= Arenaria austriaca Jacq. Flor. Austr. Tab. 270, III, p. 39, 1775.

= Arenaria Villarii Balbis. Miscell. Bot. I, 21. p. p. 1804.

= Alsine Villarsii Mut. et Koch. (V. Burnat. loc. cit. vol. I, p. 244).

Arenaria campestris All, F. P. II, 114.

= Arenaria rubra α campestris L. S. P. 423.

= Spergularia rubra Presl.

= Spergularia campestris Aschers. (V. Burnat. loc. cit. vol. I, p. 270).

Arenaria capillacea All. (A. montana All. N. 1705) F. P. II, 365, Tab. 89, fig. 2.

= *Alsine liniflora* Hegetschweiler, Flor. der Schweiz pag. 421, anno 1840. (V. Burnat loc. cit. vol. I, p. 245, nota 2).

Arenaria grandiflora All. Sp. Ped. p. 49, Tab. 10, fig. 1 et All. F. P. II, 113, Tab. 10, fig. 1.

= Arenaria grandiflora L. S. P. ed. 2 pag. 608.

Arenaria lanceolata All. Auct. ad Synop. p. 87, N. 120. — F. P. II, 114, Tab. 26, fig. 5.

= Alsine lanceolata Mert. et Koch. (1843).

Arenaria marina All. Auct. ad Synops. (sub. Arenaria maritima) p. 87, N. 129 et All. F. P. II, 114 et Herb.

= Spergularia marginata Kittel. (V. Burnat loc. cit. vol. I, p. 273).

Arenaria montana All. (non L.) F. P. II, 112.

= Arenaria liniflora L. fils. (V. Ardoino Flor. de Alp. marit. p. 66).

Arenaria obtusa All. Auct. ad Synop. p. 87, N. 121. — All. F. P. II, 114, Tab· 64, fig. 4.

= *Moehringia polygonoides* Mert. et Koch. (V. Grenier et Godron Tom. I, 256 Flor. franc.).

Arenaria recurva All. F. P. II, 113, Tab. 89 fig. 3.

= Alsine recurva Wahlenb. (1861).

Arenaria saxatilis All. F. P. II, 112 et Herb. non Vill.

= Alsine verna Bartling. (V. Burnat. loc. cit. vol. 1, p. 243).

Arenaria striata All. F. P. II, 113, Tab. 26, fig. 4.

= Arenaria verna L. Mant. 72.

= Alsine verna Bartling. (V. Burnat. loc. cit. vol. I, pag. 243).

Arenaria tetraquetra All. F. P. II, 115, Tab. 89 fig. 1.

= Gypsophila aggregata L. S. P. 406 = Arenaria tetraquetra L. Mant. alt. p. 386 = Arenaria aggregata Lois. (V. Burnat loc. cit. vol. I, p. 256).

Arnica Clusii All. Auct. ad Synop. p. 70, N. 68. All. F. P. 205, vol. I, Tab. 17, fig. 1-2.

= Doronicum Clusii Tausch in Flora XI, p. 78 (1828).

= Arnica Doronicum Rchb. Flor. exc. 223.

= Aronicum Clusii Koch.

Artemisia Boccone All. F. P. I, 169, Tab. 8 fig. 1.

= Artemisia spicata Wulf. Ap. Jacq. Flor. austr. app. p. 46, Tav. 34, (circa 1778).

Artemisia Lobelii All. F. P. I, 166.

= Artemisia camphorata Vill. Prosp. p. 31.

Artemisia rupestris All. F. P. I, 169.

= Artemisia Mutellina Vill. Prosp. 31, Tab. XIX, fig. 2.

Artemisia tanacetifolia All. F. P. I, 166, Tab. 70, fig. 2 et Tab. 10, fig. 3.

= Artemisia atrata Lam. Dict. I, p. 263 (1783).

Artemisia vallesiaca All. in Auctarium ad Synopsim Methodicam Stirpium Horti R. Taurinensis. Mélange de Philosop. et Mathem. de la Société Royale de Turin, Tom. V. (1770-73). Questa specie attribuita a Lamark. Encycl. 1. 269 (1783) deve essere riconosciuta di Allioni, il quale la pubblicava circa dieci anni avanti.

Asperula hexaphylla All. F. P. I, 12, Tab. 77, fig. 3.

= Asperula hexaphylla Wild. Sp. 61. I, part. 2, p. 576, N. 2 (1797).

= Asperula Allionii Baumg. Enum. I, 80 (1816).

Aster bifrons All. F. P. I, 197.

= Inula bifrons L. S. P. ed II, 1236.

Aster britannicus All. F. P. I, 197.

= Inula Britannica L. S. P. 882.

Aster dysentericus All. F. P. I, 196.
= Inula dysenterica L. S. P. 882.
= Pulicaria dysenterica Gaertn.
Aster ensifolius All. F. P. I, 198.
= Inula ensifolia L. S. P. 883.
Aster hirtus All. F. P. I, 195.
= Inula hirta L. S. P. 883.
Aster montanus All. F. P. I, 195.
= Inula montana L. S. P. 884.
Aster odorus All. F. P. I, 197.
= Inula odora L. S. P. 881.
= Pulicaria odora Rchb. Flor. Exc. p. 239.
Aster officinalis All. F. P. I, 194.
= Inula Helenium L. S. P. 881.
Aster pulicarius All. F. P. I, 197.
= Inula pulicaria L. S. P. 882.
= Pulicaria vulgaris Gärt. Fruct. II, 461, Tab. 173, fig. 7.
Aster salicinus All. F. P. I, 196.
= Inula salicina L. S. P. 882.
Aster squarrosus All. F. P. I, 196.
= Inula squarrosa L. S. P. ed. II. 1240.
Aster Vaillantii All. F. P. I, 196.
= Inula Vaillantii Vill. Histoire III, 216.
Astragalus foetidus All. F. P. I, 343.
= Astragalus foetidus Vill. Prosp. p. 42.
= Oxytropis foetida DC. Astrag. N. 11.
Astragalus Halleri All. F. P. I, 343.
= Oxytropis foetida DC. Astrag. N. 11 et Flor. Franc. 4, p. 566. (V. Bert. Flor. ital. VIII, 35. — Planta deest in Herb.).
Astragalus Leontinus All. Auct. ad F. P. p. 22, N. 1271*.
= Astragalus danicus Retz. Obs. II, 41, 1781. (V. Burnat loc. cit. vol. II, p. 158).
Astragalus vulnerarioides All. F. P. I, 343, Tab. 19, fig. 2.
= Anthyllis vulnerarioides Bonjean in Rchb. Flor. excurs. p. 515 sub. A. nova Bonjean in Schedulis Herbarii.

= A. Vulneraria var. Allionii DC. Prodr. 2, p. 270.

Atropa Zanoni (Mandragora) All. Auct. ad Synops. p. 63, N. 42 (1770-73). V. A. Gras. Nouvelles notes ecc. Bull. Soc. bot. franç. 1863 (?).

Avena aurata All. F. P. II, 255.

= Avena alpina Scop. Flor. Carn. I, 60 (1772).

= Avena alpina β aurata Richter (1890). (V. Asch. et Graebn. loc. cit. vol. II, p. 187).

Avena fertilis All. Auct. p. 45, N. 2255.

= Ventenata avenacea Koel. (1802).

= Ventenata dubia F. Schultz. (1863). (V. Asch. et Graebn. loc. cit. vol. II, p. 277).

Avena Scheuchzeri All. F. P. II, 255.

= Avena versicolor Vill. Prosp. 17.

Avena spicata All. Auct. 45, (1789). (Bellardi. Osservazioni botaniche, Torino 1788, p. 57).

= Avena calycina Vill. Histoir. de Pl. Dauph. II, p. 148, Tab. II, N. 9.

= Danthonia provincialis DC.

= Danthonia calycina Rchb. (V. Ascherson et Graebner loc. cit. vol. II, p. 306. Parlatore. Flora italica, vol. I, p. 296).

B.

Bassia aegyptiaca All. Il genere venne fondato in Miscell. Taur. vol III, 1762-65 p. 177, Tav. 10, fig. 2; la specie è segnata invece in Auct. ad Synops. (1770-73) p. 93, N. 137, nel quale *Auctarium,* Allioni aveva già accettato il nome linneano seguente:

= *Salsola muricata* L. Mantiss. 1767.

= Kochia muricata Schr. Neues journ. III, 1809, Tab. IV, 86.

= Echinopsilon muricatus Moquin Tandon. Prodrom. DC. Tom. XIII, p. 134. (V. A. Gras. — Note sur l'Histoire du Genre Bassia — Bullet. Société botanique de France, 1864).

Bellardia Trixago All. F. P. I, 61.

= Bartsia Trixago L. S. P. 602.

Biscutella coronopifolia All. F. P. I, 247.

= *Biscutella laevigata* L. Mant. alt. (varietas) V. Burnat loc. cit., vol. I, pag. 128-29.

Biscutella didyma All. F. P. I, 247 (non L.).

= Biscutella laevigata L. (V. Burnat loc. cit. vol. I, pag. 128).

Boadschia alliacea All. F. P. I, 248.

= Clypeola alliacea Lam.

= Peltaria alliacea L. S. P. 910.

Brachiolobos amphibius All. F. P. I, 278.

= Sisymbrium amphibium L. S. P. 657.

= Nasturtium amphibium R. Brown.

= Roripa amphibia Besser.

Brachiolobos pyrenaicus All. F. P. I, 278, Tab. 18, fig. 1.

= Sisymbrium pyrenaicum L. S. P. ed. II, 916.

= Nasturtium pyrenaicum R. Brown.

= Roripa pyrenaica Rchb.

Brachiolobos sylvestris All. F. P. I, 278, Tab. 56, fig. 2.

= Sisymbrium sylvestre L. Syst. p. 439.

= Nasturtium sylvestre R. Brown.

Brassica Erucastrum All. F. P. I, 267.

= Diplotaxis Erucastrum Gren. et Godr. Flor. Franç. I, 81.

Brassica oleracea All. Auct. p. 17, N. 967*.

= Brassica Allionii Moretti in Delectus seminum H. Bot. Ticinensis, 1829.

= Brassica Balearica Badarò Plant. lig. occ. in Botanico italiano, v. p. 12 (non B. balearica, Pers.) (V. Burnat. loc. cit. vol. I, p. 74).

Brassica Richerii All. F. P. I. 266, Tab. 58, fig. 1 et Tab. 76, fig. 2.

= Brassica Richerii. Vill. Prosp. p. 40.

Bromus agrestis All. F. P. II, 249.

= Bromus erectus Huds. Flor. Angl. edit. I, 49, 1762.

Bromus Dertonensis All. F. P. II 249.

= Festuca bromoides L. S. P. 75.

= Vulpia sciuroides Gmel. Fl. bad. I, 8.

= Festuca Dertonensis Aschers. et Graebn. Syn. p. 559, vol. II.

= Vulpia Dertonensis Gola. Sul valore sistematico del Br. Dertonensis All. v. Malpighia 1904.

Bromus ligusticus All. F. P. II, 249.
= Festuca ligustica Bert. Amoenit. italicae Bonon. 1819, p. 8. (V. Ascherson et Graebner vol. II, loc. cit. p. 554).

Bromus Plukenetii All. F. P. II, 250.
= Bromus ramosus L. Mantis. 34 (1767).
= Brachypodium ramosum Roemer et Schultz (1817).
= Brachypodium Plukenetii Ascherson et Graebn. loc. cit. vol. II, p. 637.

Buceras corniculatum All. F. P. I, 313.
= Trigonella corniculata L. S. P. 1094.

Buceras monspeliacum All. F. P. I, 313.
= Trigonella monspeliaca L. S. P. 777.

Buceras polyceration All. F. P. I, 313.
= Trigonella polycerata L. S. P. 1093.

Buglossum angustifolium All. F. P. I, 47.
= Anchusa angustifolia L. S. P. 133.

Buglossum sempervirens All. F. P. I, 48.
= Anchusa sempervirens L. S. P. 134.

Bugula alpina All. F. P. I, 45.
= Ajuga genevensis L. S. P. 561.

Bugula Chamaepitys All. F. P. I, 46.
= Ajuga Chamaepitis Schreb. Unilab. p. 21.

Bupleurum Gerardi All. Auct. ad. Synop. (1770-73) et All. F. P. II. 24.
= Bupleurum Gerardi Jacq. Flora Austr. vol. III, p. 31, Tab. 256, (1775). (V. Gras. Rectifications ec. loc. cit. 1861, et Gras. in Delponte, Guida allo studio delle Piante coltivate nel R. Orto botanico di Torino. 1874, pag. XI.

C.

Cacalia alpina var. *tomentosa* All. F. P. I, 178.
= Cacalia tomentosa Vill. Prosp. 31.
= Cacalia tomentosa Vill. Hist. 3, 171.
= Adenostyles Leucophylla Rchb.

= Adenostyles Candidissima Cass.

Cachrys Morisoni All. Auct. p. 23 (1789).

= Cachrys laevigata Lam. Encycl. 1, p. 256 (1783).

Campanula alpestris All. Rar. Ped. Stirp. specimen l.m 1755, p. 36, Tab. VI, fig. 3. — Auct. ad Syn. Met. Stirp. Hort. R. Taur. 1770-73, p. 63.

= *Campanula Allionii* Vill. Prosp. p. 22, 1779.

Campanula Bellardi All. F. P. I, 108, Tab. 85, fig. 5.

= Campanula caespitosa Scop. ed. II, Tom. I, p. 143, Tab. 4, 1772.

Campanula Elatines All. F. P. I, 114, Tab. 7, fig. 2.

= Campanula Elatines L. S. P. 240 ed. II.

Campanula petraea All. F. P. I, 112.

= Campanula glomerata L. S. P. 166.

Campanula rotundifolia All. F. P. I, 108.

= Campanula rhomboidalis L. S. P. 165.

Campanula urticifolia All. F. P. I, 110,

= Campanula latifolia L. S. P. 165.

Campanula valdensis All. F. P I, 109, Tab. VI fig. 1 et All. Spec. Ped. Stirp. p. 39, Tab. VI, fig. 2.

= Campanula Scheuchzeri Vill. Prosp. p. 22, N. 43, β. hirta Koch. (Flor. Germ. 406).

Campanula vesula All. F. P. I, 108, Tab. 7, fig. 1.

= Campanula persicifolia L. S. P. 164. (V. Bertol. vol. 2 p. 471).

Cardamine bellidifolia All. F. P. I, 260, Tab. 18, fig. 3.

= Cardamine alpina Willd. Sp. III, p. 481 (1799).

Cardamine granulosa All. Auct. p. 16.

= *Cardamine pratensis* L. S. P. 656. (Vedi A. Gras. Note sur le Cardamine granulosa All. Bull. Soc. bot. Franç. Tom. VIII, 1861, p. 463. — V. Burnat. loc. cit. vol. I, 105.

Cardamine parviflora All. F. P. I, 261.

= Cardamine hirsuta L. S. P. 915. (V. Burnat loc. cit. vol. I, 106).

Cardamine Thalictroides All. F. P. I. 261, Tab. 57, fig. 1.

= Cardamine Plumierii Vill. Prosp. p. 38.

Carduncellus Monspeliensium All. F. P. I, 154.

= Carthamus Carduncellus L. S. P. 831.

Carduus tinctorius All. F. P. I, 148.

= Serratula tinctoria L. S. P. 816.

Carex acuta All. F. P. II, 273.

= Carex riparia Curt. Fl. Lond. IV, T. 60 (circa 1783).

Carex alpestris All. F. P. II, 270.

= Carex gynobasis Vill. Pl. Dauph. II, p. 206 (1787).

= Carex Halleriana Asso. Synops. Stirp. N. 922, Tab. 9, fig. 2 (1779). (V. Grenier et Godron Fl. Franç. III, 416).

Carex approximata All. F. P. II, 267.

= Carex ericetorum Poll. β approximata Richt. Plant. Europ. 1, 157 (1890). (V. Ascherson et Graebner loc. cit. vol. III p. 122).

Carex Bellardi All. F. P. II, 264, Tab. 92, fig. 2.

= Carex myosuroides Vill. Prosp. 17 (1779).

= Elyna spicata Schrad. Flor. Germ. I, 155 (1806).

= Elyna Bellardi K. Koch. Linnaea XXI (1848). (V. Ascherson et Graebner, vol. III, p. 3).

Carex bicolor (Bellardi) All. F. P. II, 267.

= Carex Androgyna Balbis. Add. Flor. Ped. 9 (1792).

Carex bipartita (Bellardi) All. F. P. II. 265 Tab. 89, fig. 5.

= Kobresia caricina Wild. Sp. Plant. IV, 206 (1805).

= Kobresia bipartita Dalla Torre (1882). (V. Ascherson et Graebner vol. III, p. 5).

Carex conglobata All. F. P. II, 268.

= Carex montana L. S. P. 975.

Carex Curvula All. F. P. II, 264, Tab. 92, fig. 3.

= Carex lobata Bell. App. Flor. Ped. 42 (1792).

Carex elata All. F. P. II, 272.

= Carex stricta Good. in Traus. Linn. Soc. II, 96, 1794. Intorno alla sinonimia dubbiosa relativa a questa specie, vedi Ascherson et Graebner II vol. loc. cit. II Abth. p. 83-84.

Carex foetida All. F. P. II, 265. Questa specie è stata indicata dal Villar, soltanto nella sua *Histoire* (loc. cit.) quindi ricordata da lui solo nel 1787; epperciò, come già osservava A. Gras. (v. Notes sur

quelques rectificatiens de Svnonymie, Bull. Soc. bot. Franç. 1861) non può essere ascritta a Villars (Prospect.) come si légge nel Nyman e in altri. (V. Ascherson et Graebner loc. cit. p. 3, 38, vol. II).

Carex foliosa All. F. P. II, 270. Di questa specie allioniana, intorno a cui molto fu scritto, non è possibile dare la sinonimia, imperocchè mancano le figure tanto nella *Flora*, come nella *Iconographia* e manca pure la pianta in Erbario. — La maggior parte dei botanici ritiene la specie sinonima di *Carex foliosa* Gaud. Agrost. Helv. II, 191, e quindi di *C. flava* L. — mentre altri la credono sinonima di *C. caespitosa* G. Malgrado le più minute ricerche fatte non possiamo esprimere una opinione sicura.

Carex frigida All. F. P. II, 270.

= Carex helvetica Honck. Syn. I, 375 (1792). (V. Ascherson et Graebner loc. cit. p. 173).

Carex fusca All. F. P. II, 269.

= Carex polygama Schk. Riedgras. 84, T. 76 (1801).

= Carex Buxbaumii Wahl. K. Acad. Handl. XXIV, 163 (1803). (V. L. H. Bailey, Studies of the Types of various Species of the Genus Carex. — Mem. Torr. Bot. Club. vol. N. 1, p. 63, 1889).

Carex juncifolia All. F. P. II, 264, Tab. 92, fig. 4.

= Carex incurva Lightf. Flor. Scot. II, 544, Tab. 24, fig. 1 (1777).

Carex mucronata All. F. P. II, 268.

= Carex bracteata Sut. Flor. Helv. II, 250 (1802) (V. Ascherson et Graebner loc. cit. p. 167).

Carex nigra (Bellardi) All. F. P. II, 267.

= Carex parviflora Host. Gram. Austr. I, 586, Tab. 87 (1801). (V. Ascherson et Graebner loc. cit. vol. II, Abt. II, p. 110).

Carex obaesa All. F. P. II, 270.

= Carex nitida Host. Gram. Austr. I, 53, 1801. (V. intorno alla dubbiosa sinonimia di questa specie, Ascherson et Graebner loc. cit. p. 113).

Carex patula All. F. P. II, 271.

= Carex patula Scop. Flor. Carn. ed. II, II, 226 (1772).

= Carex sylvatica Huds. Flor. Angl. ed. I, 353 (1762).

Carex pedata All. F. P. II, 268.

= Carex ornithopoda Willd. Sp. pl. IV, 255 (1805).

= Carex ornithopus V. Ascherson et Graebner loc. cit. p. 162 vol. II, Abt. II.

Carex pilosa All. F. P. II, 269.

= Carex pilosa Scop. Flor. Carn. ed. 2, II, 226 (1772).

Carex prostrata All. F. P. II, 267.

= Carex humilis Leyss. Fl. Hal. 175 (1761).

Carex rupestris (Bellardi) All. F. P. II, 264, Tab. 92, fig. 2.

= Carex petraea Walhenb. (1803).

Carex saxatilis All. F. P. II, 270 (1785).

= *Carex sempervirens* Vill. Hist. Pl. Dauph. II, 214 (1787). (V. Ascherson et Graebner II vol. p. 169).

Carex strigosa All. F. P. II, 270.

= Carex brachystachys Schranck. Nat. Br. II, 285, (1785).

Carex trigona All. F. P. II, p. 269, Tab. 89, fig. 4.

= Carex fulva Good. Trans. Linn. Soc. II, 177 (1794). Intorno alla dubbiosa sinonimia di questo Carex V. Ascherson et Graebner loc. cit. p. 195.

Carex tripartita All. F. P. II, p. 265, Tab. 92, fig. 5.

= Carex curvula All. F. P. II, p. 264, Tab. 92, fig. 3. Quantunque *Balbis*, *Parlatore* e molti altri si sieno occupati della sinonimia di questa specie, non si potrà sapere nulla di concreto intorno ad essa, poichè manca qualsiasi autoptico esemplare di Erbario. La Sinonimia sopra segnata, crediamo però, per nostre ricerche, debba essere la vera.

Carlina acanthifolia All. Auct. ad Synop. 1770-73, p. 67, N. 55 et All. F. P. I, 156, Tab. 51.

= Carlina Chardousse Vill. Prosp. 27, N. 80 (1779).

= Carlina transilvanica Schur. (1853).

Caucalis aequicolorum All. F. P. II, 33.

= Scandix Anthriscus L. S. P. 257. (Anthriscus vulgaris, Bernh.).

Caucalis nodiflora All. F. P. II, 32.

= Torilis nodosa Gaert. Fruct. I, p. 82, Tab. 20 f. 6, 1788.

Centaurea elegans All. F. P. I, 163, Tab. 49, fig. 1, et All. Auct. p. 11. N. 599.

= Galactites tomentosa, Moench. Method. p. 558, 1794.

Centaurea galactites All. F. P. I, 163.

= Galactites tomentosa Moench. Method. p. 558, 1794.

Centaurea hybrida All. F. P. I, 161. (V. Bertoloni vol. IX, Flora Ital. p. 446).

Centaurea Isnardi All. F. P. I, 161.

= Centaurea aspera L. S. P. 916. β genuina Briquet. loc. cit. p. 169.

Centaurea nicaensis All. F. P. I, 162, Tab. 74.

= Centaurea fuscata Desf. Flor. Atl. II, p. 302, Tab. 244. (1798-1800). (Intorno alla opportunità di questo nome v. Briquet. loc. cit. p. 176).

Centaurea splendens All. F. P. I, 160.

= Centaurea splendens L. S. P. 914.

Centaurea Triumfetti All. Auct. ad Synop. (11770-73) p. 68 et All. F. P. I, 158.

= Centaurea axillaris Wild. Sp. Pl. III, p. 2290, (1804).

= Centaurea montana L. S. P. 911 (1753) sensu latissimo. β Triumfetti Briquet, Monog. d. Centaurées, p. 114, 1902.

Cerastium alpinum All. F. P. II, 116.

= Cerastium arvense L. S. P. 438 (V. Burnat. loc. cit. vol. I. p. 266.

Cerastium lineare All. F. P. II. p. 365, Tab. 88, fig. 4.

= Cerastium strictum All. F. P. II, 117. V. G. Negri, Il Cerastium lineare All. in Malpighia 1904.

Cerastium refractum All. F. P. II, 117.

= Cerastium trygynum Vill. Prosp. 48.

= Stellaria cerastioides L. S. P. 422.

Cerastium strictum All. F. P. II, 117. (V. ivi p. 365 sub. *Cer. lineare* All.).

Cerinthe maculata All. F. P. I. 51.

= Cerinthe maculata L. S. P. 137 (p. p.).

= Cerinthe maculata M. Bieb. (V. G. Gola, Osservazioni sulla *Cerinthe maculata* All. in Malpighia 1904.

Chamaemelum alpinum All. F. P. I, 186.
= Anthemis alpina L. S. P. ed. II, p. 1261.
Chamaemelum arvense All. F. P. II, 186.
= Anthemis arvensis L. S. P. 1261 ed. II.
Chamaemelum Cota All. F. P. I, 184.
= Anthemis Cota L. S. P, 893.
Chamaemelum cotulà All. F. P. I. 186.
= Anthemis cotula L. S. P. ed. II, 1261.
Chamaemelum discoideum All. F. P. I, 188.
= Anthemis discoidea Wild. Sp. Plant. III, part. 3, p. 2188.
= Anthemis tinctoria L. S. P. 896 β discoidea Wild.
Chamaemelum maritimum All. F. P. I, 184.
= Anthemis maritima L. S. P. 893.
Chamaemelum mixtum All. F. P. I, 185.
= Anthemis mixta L. S. P. 894.
Chamaemelum montanum All. F. P. I, 187.
= Anthemis montana L. S. P. ed. II, 1261.
Chamaemelum nobile All. F. P. I, 185.
= Anthemis nobilis L. S. P. 894.
Chamaemelum tinctorium All. F. P. I, 187.
= Anthemis tinctoria L. S. P. 896.
Chamaemelum tomentosum All. F. P. I, 184.
= Anthemis tomentosa L. S. P. 893.
= Anacyclus clavatus Pers.
= Anacyclus tomentosus DC.
Chamaemelum triunfetti All. F. P. I, 187. V. Anthemis Triunfetti All.
Chamaemelum valentinum All. F. P. I, 187.
= Anacyclus valentinus L. S. P. 892.
Cheiranthus alpinus All. F. P. I, 271, Tab. 20, fig. 2 et Spec. Ped. p. 44, Tab. 9, fig. 3.
= Erysimum pumilum Gaud. Sec. Bertoloni, Flor. Ital. vol. VII, p. 88. — Notisi che nell'Erbario di Allioni le specie che vi si contengono, sotto questo nome, non corrispondono, nè alla descrizione, nè alla pianta indicata da Allioni (V. Burnat. loc. cit. vol. I, p. 87).

Cheiranthus Boccone All. F. P. I, 272, Tab. 58, fig. 2.
= Erysimum grandiflorum Desf. Flor. Atl. (1798-1800). V. Burnat loc. cit. vol. I, p. 86.

Cheiranthus littoreus All. F. P. I, 273.
= Malcolmia littorea R. Brown. Hort. Kew. ed. II, vol. IV p. 121.

Cheiranthus maritimus All. F. P. I, p. 272.
= Malcolmia maritima R. Brown. loc. cit.

Cheiranthus tristis All. Auct. ad Synop. p. 75, N. 84 et All. F. P. I, 273 (p. p.).
= Mathiola tristis R. Brown. (V. Burnat. loc. cit. vol. I, p. 83).

Chenopodium augustanum All. Auct. ad Synops. p. 93, N. 139 et All. F P. II, 198, Tab. 38, fig. 4.
= Kochia prostrata Schrad. Neues. journ. III, 1809, et IV, 85.

Chenopodium fruticosum All. F. P. II, 198.
= Salicornia fruticosa L. S. P. ed. II, p. 5.

Chrysanthemum ceratophylloides All. F. P. I, 190, Tab. 37, fig. 1.
= Leucanthemum coronopifolium Gren. et Godr. β ceratophylloides Gren et Godr. (v. loc. cit. Flor. de France, II, 143).

Chrysanthemum discoideum All. F. P. I, 190, Tab. 11, fig. 1.
= Plagius Allionii L. Heritier mss. (V. DC. Prodr. VI, 135).
= Plagius virgatus DC. ib.

Chrysanthemum montanum All. F. P. I, 190, Tab. 37, fig, 2.
= Leucanthemum maximum DC. Prodr. XI, p. 46. (V. Gren. et Godr. Flor, Franç. vol. II, p. 141).

Cineraria alpina All. F. P. I, 203, Tab. 38, fig. 2.
= Senecio aurantiacus DC. Prod. VI, p. 361.

Cineraria longifolia All. F. P. I, 203, (non Jacq.).
= Senecio Balbisianus DC. Prod. VI, p. 360 (1837).
= Cineraria Balbisiana, Bert. IX, Flor. it., p. 290 (1853).

Cirsium acaule All. F. P. I, 153.
= Carduus acaulis L. S. P. 1156, ed. II.
= Cnicus acaulis Wild. Prodr. Flor. Berol. N. 801, Tab. 6, fig. 11.

Cirsium ambiguum All. Auct. Flor. Ped., p. 10, N. 553*.
= Cnicus ambiguus Lois. Gall. ed. 1, p. 540, (? variet. C. heterophylli All.).

Cirsium canum All. F. P. I, 151.

= *Cirsii pratensis* (DC. Prodr. vol. VI, p. 644) videtur varietas esse. (cf. Koch. Synop. ed. II, p. 338 et 745).

Cirsium carniolicum All. F. P. I, 149 (non Scop.).

= Cirsium rivulare Link. Enum. Hort. Berol. II, p. 301 (1822).

Cirsium helenioides All. F. P. I, 152, Tab. 13.

= Cirsium heterophyllum All. F. P. I, 152, Tab. 34, (varietas foliis omnibus integris).

Cirsium heterophyllum All. F. P. 1, 152, Tab. 34.

= Carduus heterophyllus L. S. P. 1154, ed. II.

= Cnicus heterophyllus Wild. Sp. III, p. 1673.

Cirsium medium All. F. P. I, 149, Tab. 49, fig. 2.

= Cirsium zizianum Koch. Synop. ed. I, p. 398.

= Cirsium bulboso-acaule Nägeli in Koch. Syn. p. 1003.

= Cnicus acauli-tuberosus Schiede. De plant. hybr. p. 61. (V. Gren. et Godr. Flor. Franç. p. 224 vol. II).

Cirsium monspessulanum All. F. P. I, 152.

= Carduus monspessulanus L. S. P. 822.

Cirsium ochroleucum All. F. P. I, 150.

= Cnicus Erisithales L. S. P. ed. II, 1157.

= Cirsium Erisithales Scop. Flor. Carn. II, ed. 2, p. 125.

Cirsium oleraceum All. F. P. I, 149.

= Cnicus oleraceus L. S. P. 826.

= Cirsium oleraceum Scop. Flor. Carn. 2, ed. 2, 124 (1772).

Cirsium purpureum All. F. P. I, 150, Tab. 36.

= Cirsium heterophyllo-spinosissimum Naegeli in Koch. Syn. 1006.

= Cnicus Cervini Koch. Syn. ed. I, p. 399. (V. Koch. Syn. ed. alt. p. 756 et Gren. et Godr. vol. II, Flor. franç. 222).

Cirsium pyrenaicum All. F. P. I, 151, Tab. 12.

= Cirsium montanum Spr. Syst. veg. III, p. 376. (v. Bert. Flor. ital. IX, 18).

Cirsium rivulare All. Auct. F. P. p. 10 N. 543.

= Carduus rivularis Jacq. Flor. Aust. 1. p. 57, Tab. 91.

= Cirsium rivulare Linck. Enum. Hort. Berol. II, p. 301 (1822).

Cirsium servatuloides All. F. P. I, 152.
= Cirsium serratuloides Scop. Flor. Carn. 2, p. 127.
= Cirsium pannonicum Gaud. Flor. Helv. 6. 363.
Cirsium stellatum All. F. P. I, 153.
= Carduus stellatus L. S. P. 823.
= Chamaepeuce stellata DC. Prodr. VI, p. 658.
Cirsium tuberosum All. F. P. I, 151.
= Carduus tuberosus L. S. P. ed. II, 1154 var. β.
= Cirsium bulbosum DC. Flor. franc. IV, 118.
= Cirsium bulbosum DC. var. γ vulgare Koch. Syn. ed. II, p. 745.
Cistus canus All. F. P. II, 103, Tab. 45, fig. 3 et Herb.
= Helianthemum Allionii, Tin. Plant. rar. Siciliae fasc. 2, p. 43.
= Helianthemum canum Dunal. in DC. Prodr. I, 277 var. (V. Moris Flor. Sardoa I, 202).
Cistus ledifolius All. F. P. II, 104.
= Helianthemum ledifolium Wild.
Cistus lunulatus All. Auct. F. P. 30, Tab. 2, fig. 3.
= Helianthemum lunulatum DC. Flor. franc. IV, 816.
Cistus pilosus All. F. P. II, 104, Tab. 45, fig. 1, 2 non L.
= Helianthemum polifolium Mill. Gren. Godr. Flor. Franc. p. 170 (V. Burnat. loc. cit. vol. I, p. 158).
Cistus roseus All. Auct. ad Synop. p. 89 N. 127. et All. F. P. II. 105 Tab. 45, fig. 4.
= Helianthemum roseum Bert. Flor. Ital. IV, 386.
= Helianthemum Chamaecistus Mill. (1768) var. β. roseum Burnat. loc. cit. vol. I, pag. 155.
Cistus rosmarinifolius All. F. P. II, 105.
= Helianthemum hirtum Pers.
Clematis erecta All. F. P. I, 296.
= Clematis recta L. S. P. 544.
Clematis flammula All. F. P. I, 297.
= Clematis flammula L. S. P. 544.
Clematis maritima All. F. P. I, 297.
= Clematis flammula L. S. P. v. β. 544.

Clypeola calycina All. F. P. I, 246.
= Alyssum calycinum L. S. P. Ed. II, 908.
Clypeola montana All. F. P. I, 246.
= Alyssum montanum L. S. P. 907.
Colchicum montanum All. F. P. I, 117, Tab. 74, fig. 2.
= Colchicum alpinum DC. Flor. Franc. 3 p. 195.
Coriandrum aquilegifolium All. Auct. ad Synop. p. 81, N. 100.
= Phellandrium aquilegifolium All. in notis mss. (1).
= Danaa aquilegifolia All. F. P. II, 34, Tab. 63.
= Physospermum aquilegifolium Koch. (V. A. Gras. Notes de Synonymie. Bull. Soc. bot. Franç. 1861).
Coronilla glauca All. F. P. I, 335 (non L.).
= Coronilla valentina L. S. P. 1047 ed. II. (Sec. Ardoino loc. cit. p. 118. — V. Burnat loc. cit. p. 211, vol. II, per quanto ha rapporto all'esame degli esemplari dell'Erbario).
Coronopus Ruellii All. F. P. I, 256.
= Lepidium squamatum Forskal Flor, Aeg. Arab. p. 117 (1775).
= Senebiera coronopus Poir.
= Coronopus squamatus Aschers. Flor. Prov. Brand. 1, pars. 2, p. 62, 1864.
Crambe Corvini All. F. P. I, 256.
= Bunias Cochlearioides Murray in Nov. Com. Goett. an. 1777 Tom. 8. p. 42, Tab. 3.
= Calepina cochlearioides Dumort. (1827) V. Burnat loc. cit. 125.
Crambe paniculata All. F. P. I, 256.
= Myagrum paniculatum L. S. P. 641.
= Vogelia paniculata Hornem.
= Neslia paniculata Desv.
Crepis albida All. F. P. I, 219 Tab. 32, fig. 3.
= Crepis albida Vill. Prosp. p 37, Tav. XII, fig. 1.
Crepis austriaca All. F. P. I, 220, Tab. 30, fig. 1.
= Crepis blattarioides. Vill. Hist. Plant. Dauph. III, 136 et Flor. Delph. in edit. Gilibert. Linn. Syst. 1785.

---

(1) V. nota a pag. 48.

Crepis echioides All. F. P. 222.
= Picris Echioides L. S. P. 792.
= Helminthia echioides Gärt. Fruct. II, p. 368 T. 159, fig. 2.
Crepis leontodontoides All. Auct. p. 13, N. 805.
= Barkhausia leontodontoides DC.
Crepis nemausensis All. F. P. I, 221, Tab. 75, fig. 1.
= Pterotheca nemausensis Cassin. Dict. Scien. Nat. Tom. 44, p. 56.
Crepis rubra All. F. P. I, 219.
= Crepis rubra L. S. P. ed. II, 1132.
Crepis sprengeriana All. F. P. I, 221.
= Picris pauciflora Wild. Sp. Pl. III, p. 1557.
Crocus sativus All. F. P. I, 84.
= Crocus sativus L. S. P. 36.
Crocus vernus All. Auct. ad Synop. p. 56 (1770-73) et All. F. P. I, 84.
= Crocus vernus Wulf. in Jacq. an. V. app. 47 (1778) (Teste Nyman).
Cucubalus alpestris All. Auct. 28, Tab. 1, fig. 3 et Herb.
= Silene Campanula Pers. Syn. I, 500.
Cynoglossum creticum All. Auct. F. P. p. 4 (1789).
= Cynoglossum creticum Mill. Gard. Dict. VIII, N. 3 (1768).
= Cynoglossum creticum Vill. Hist. Plant. Dauph. II, p. 457 (1787).
= Cynoglossum pictum Ait. Hort. Kew. ed. I, 179 (1789).
Cyperus distachyos All. Auct. F. P. p. 48, Tab. 2, fig. 5.
= Cyperus mucronatus Wild.
Cyperus globosus All. Auct. p. 49, 2358.*
= Cyperus fascicularis DC. Flor. Franc. (non al.) III, 722.

D.

Danaa aquilegifolia All. F. P. II, 34, Tab. 63.
= Ligusticum Lobelii Vill. Prosp. 24.
= Physospermum aquilegifolium Koch. (1824).
Daphne (Thymelea) Sanamunda All. F. P. I, 132.
= Passerina Thymelea DC. Flor. franc. V, p. 366.
Daucus mauritanicus All. F. P. II, 31, Tab. 61, fig. 1.
= Daucus Carota L. S. P. 242.

Delphinium elatum All. F. P. II, 63.
= Delphinium elatum L· S. P. 531.
= Delphinium montanum DC.

Delphinium peregrinum All. Stirp. Nicaens. p. 200 (1757). — All. Synops. Methodica. p. 71. — Auct. ad Synop. p. 89, N. 129. — F. P. II, p. 63, Tab. 25, fig. 3.
= Delphinium gracile De Not. Repert. p. 479. (V. Burnat loc. cit. vol. I, le osservazioni intorno agli esemplari di Erbario).

Dentaria pentaphyllos All. F. P. I, 259.
= Dentaria digitata Lam. (p. p.).

Dianthus alpinus All. F. P. II, 77.
= Dianthus neglectus Loisel. in journ. bot. 1809, p. 321. (V. Burnat. loc. cit. vol. I, pag. 232).

Dianthus atrorubens All. F. P. II, 75 et Herb.
= Dianthus Allionii Colla Herb. Ped. I, 297.

Dianthus Carthusianorum All. F. P. II, 74.
= Dianthus Seguierii Vill. Prosp. 48. (V. Burnat. loc. cit. vol. I, p. 225).

Dianthus plumarius All. F. P. II, 76,
= Dianthus superbus L. S. P. 589.

Digitalis grandiflora All. Auct. ad Synops. p. 61, N. 28 et All. F. P. I, 70.
= Digitalis ambigua Murr Prodr. Goett. 62 (1770).

Digitalis parviflora All. F. P. I, 70.
= Digitalis lutea L. S. P. 622.

Draba nemorosa All. F. P. I, 244.
= Draba muralis L. S. P. 643.

E.

Echium lusitanicum All. F. P. I, 52.
= Echium calycinum Viv. Ann. di Botanica, Genova vol. I, Part. II, 1804.

Epilobium Gesneri All. F. P. I, 279.
= Epilobium Gesneri Vill. Prosp. 45.

= Epilobium angustifolium L. S. P. 347.

Epilobium grandiflorum All. F. P. I, 279.

= Epilobium hirsutum L. S. P. 347.

Epilobium hirsutum All. F. P. I, 279.

= Epilobium parviflorum Schreber Spicil. p. 146 (1771).

Epipactis abortiva All. F. P. II, 151.

= Orchis abortiva L. S. P. 943.

= Limodorum abortivum Swartz. Nov. act. Holm. 6. p. 8, (1799).

Epipactis cordata All. F. P. I, 152.

= Listera cordata R. Brown. Hort. Kew. 5. p. 201.

Epipactis epipogium All. Auct. F. P. p. 32, N. 1853.*

= Satyrium Epipogium L. S. P. 945.

= Epipogium Gmelini Rich. (1818).

Epipactis nidus avis All. F. P. II, 151.

= Neottia nidus avis Richard.

Epipactis latifolia All. F. P. II, 152.

= Serapias latifolia L. Mant. 490.

Epipactis ovata All. F. P. II, 151.

= Ophrys ovata L. S. P. 946.

= Listera ovata R. Brown.

Epipactis rubra All. F. P. II, 153.

= Cephalanthera rubra Rich. Orchid. Europ. p. 38.

Epipactis spiralis All. F. P. II, 152.

= Ophrys spiralis L. S. P. 945.

= Spiranthes autumnalis Richard.

Euphorbia nicaensis All. F. P. I, 285, Tab 69, fig. 1.

= Tithymalus Seguierii Scop. Flor. Carn. Ed. II, p. 355, N. 574, Tab. 20 (1772).

Euphorbia Seguierii All. F. P. I, 288.

= Tithymalus Seguieri Scop. Flor. Carn. ed. II, p. 355, N. 574, tab. 20 (1772).

= Euphorbia nicaensis All. F. P. I, 285, Tab. 69, fig. 1.

Euphorbia taurinensis All. F. P. I, 287, Tab. 87, fig. 2.

= Euphorbia terracina Reichb. Flor. Germ. Excur. 759 (1830). Se-

condo Colla Herb. Pedemontanum vol. 5, p. 123. = E. terracina L. S. P. ed. II, p. 654.

F.

Festuca altissima All. Auct. Flor. Ped. p. 43 (1789).
= Festuca sylvatica Vill. Hist. Plant. Dauph. II, 105 (1787).
Festuca amethystina All. F. P. II, 252 (?)
= Festuca duriuscula Linn. S P. 108 edit. II, (V. Parlatore Flor. ital. vol. I, p. 437). Nell' Erbario di Allioni sotto questo nome esistono tre specie distinte di Festuche: *duriuscula, varia e pilosa).*
Festuca glomerata All. F. P. II, 252.
= Dactylis glomerata L. S. P. 71.
Festuca Halleri All. P. P. II, 253. (V. Ascherson et Graebner loc. cit. vol. II, p. 481).
Filago acaulis All. F. P. I, 171.
= Filago pygmaea L. S. P. 927.
= Evax pygmaea Pers. Syn. 2, p. 422, (1807).
Foeniculum officinale All. F. P. II, 25 (1785).
= Foeniculum vulgare Gaertn. Fruct. 1, 105, Tom. 23 (1788).
= Foeniculum capillaceum Gilib. Flor. lithuanica, II, 40 (1782).
Fosselinia jonthlaspi All. F. P. I, 246.
= Clypeola jonthlaspi L. S. P. 910, edit. II.
Fragaria sterilis All. F. P. II, 60.
= Potentilla micrantha Ramond in DC. Flor. franc. IV, 468. (V. Burnat loc. cit. vol. II, p. 243).
Fritillaria involucrata All. Auct. Fl. P. 34.
= Fritillaria pyrenaica β. involucrata DC. Flor. franc. 3, 725.
= Fritillaria Meleagris var. β. Bertoloni Flor. ital. IV, 75.
Fumaria capnoides All. F. P. I, 299.
= Corydalis capnoides DC. Syst. (V. Burnat loc. cit. vol. I, p. 65).
Fumaria bulbosa All. F. P. I, 299.
= Fumaria bulbosa L. S. P. 609.
= Corydalis Tuberosa DC. Flor. franc. IV, 637.
= Corydalis cava Schweigger et Körte.

G.

Galanthus autumnalis All. Auct. F. P. p. 33.
= Leucojum hyemale DC. Flor. franc. 3, p. 327.
= Ruminia hyemalis Parlat. Flor. it. III, p. 85.

Galanthus nivalis All. F. P. II, 155.
= Galanthus nivalis L. S. P. 288.

Galium Boccone All. F. P. I, 6.
= Galium anisophyllum Vill. Prosp. p. 20 (Ex Gren. et Godr.).

Galanthus vernus All. F. P. II, 155.
= Leucojum vernum L. S. P. 289.

Galium cinereum All. Auct. ad Synop. (1770-73) p. 57, N. 14. — All. F. P. I, 6, Tav. 77, fig. 4.
= Galium argenteum Vill. Prosp. p. 20 (1779) Annuente All. in mss. (1).

Galium glaucum All. F. P. I, 7.
= Galium glaucum L. S. P. 156.
= Asperula galioides M. Bieb. Flor. Taur. Cauc. 1, 101 (1808).

Galium lucidum All. Auct. ad Syn. (1770-73) p. 57, N. 13 et All. F. P. I, 5, Tav. 77, fig. 2.
= *Galium Corrudaefolium* Vill. Prosp. 20, N. 2 (1779).

Allioni si occupò di questa specie già nell' anno 1755, a pag. 5 delle *Stirpium precipuarum litt. et agr. Nic.* nella quale opera ne fece la descrizione.

Più tardi comunicò esemplari di qnesta stessa pianta al suo amico e corrispondente Bonifacio Felice Bochiardo (2) di Pinerolo, col nome di *Galium splendens*, come si rileva dalla seguente nota del mss. « *Campo botanico Pinerolese* » dove il nome della specie è seguita dalla nota « *Doctoris Allionii ex edendis.* » — Lo stesso nome di *Galium splendens* l'Allioni scrisse pure di sua mano come sinonimo del *Galium corrudaefolium* nell' esemplare del *Prodromus* di Villars, conservato nella Bi-

(1) V. nota a pag. 48.

(2) V. I. Chiapusso-Voli e O. Mattirolo, *Les Bochiardo — Botanistes Piémontais — d'après leurs manuscrits inédits.* Bullettin de l'Herbier Boissier 2 Serie, Tom. IV, 1904.

blioteca della R. Accademia delle Scienze di Torino [1]; e, cosa curiosa, ciò egli fece dopo il 1779, mentre già nell'anno 1770 aveva definitivamente adottato il nome di *Galium lucidum* (v. Auct. ad Synop. p. 57, N. 13). La Tavola IV del volume XXVI della *Iconographia Taurinensis*, dove è riprodotto il *Galium lucidum* porta pure di pugno di Allioni il nome di *Galium splendens!* Qnesto scambio di nomi che A. Gras [2] chiama une « *distraction amusante* » di Allioni, non rappresenta però un caso isolato nell'opera di Allioni, nello studio della quale abbiamo potuto rilevare altre consimili *distrazioni*, le quali condussero alcune volte l'Allioni ad indicare con due nomi una stessa pianta. Così ad es.: il *Ranunculus auricomus* Linn. è indicato coi due nomi di *auricomus* e di *polymorphus*. Il *Sedum Cepaea* Linn. con quelli di *cepaea* e di *gallioida*. — Alla *Brassica Cheiranthos* di Vill. diede i nomi di *recurvata* e di *Tournefortii*. — La *Veronica verna* Linn. indicò coi nomi di *romana* e di *succulenta*, ecc., come si può osservare in questo nostro repertorio.

Galium megalospermum All. F. P. I, 9, Tab. 79, fig. 4.
= Galium megalospermum Vill. Hist. d. Pl. Dauph. (1787) 2, p. 319. (V. Gren. et Godr. II, p. 38).

Galium murale All. F. P. I, 8, Tab. 77, fig. 1.
= Callipeltis muralis Moris. Flor. Sard. 2, 309.
= Valantia filiformis Ten.

Galium pedemontanum (Bellardi) All. Auct. Fl. P. 2, N. 32.*
= Valantia pedemontana Bell. Osservazioni botaniche Torino 1788 et Bell. App. (1790-91-93) p. 252.

Galium saccharatum All. F. P. I, 9, et All. Stirp. Nicaens p. 4 (1757).
= Valantia aparine L. S. P. ed. II, 1491.

Galium spurium All. F. P. 1, p. 5.
= Galium spurium L. S. P. Edit. II, 154.

Galium tenuifolium All. Auct. ad Synop. 58, N. 15, F. P. I, 6.

---

[1] Questo rarissimo volume così frequentemente citato dal Gras, al quale siamo ricorsi per risolvere molte questioni, annotato dall'Allioni stesso è quotato: DD. IV. G.

[2] V. A. Gras, *Note sur quelques rectifications de Synonymie*. Bull. Soc. bot. franç. 1861. Ext. p. 6.

= Galium Gerardi Vill. Prosp. 19, N. 29. (Secondo una annotazione di mano dello stesso Allioni sopra l'esemplare del *Prospectus* posseduto della R. Accademia delle Scienze di Torino).

= Galium lucidum All. sec. Koch. Flor. Germ. 286 et Nyman. pag. 325.

Galium trichophyllum All. Auct. p. 1, N. 18.*

= Galium pusillum L. S. P. ed. II, p. 106 (var.).

= Galium pumilum Lam. Dict. 2, 580.

Genista sibirica All. F. P. II, 364.

= Genista tinctoria L. var. α genuina Gren. et Godr. Flor. Franc. 1, 352. (V. Burnat loc. cit. vol. II, p. 62).

Gentiana amarella All. F. P. I, 97.

= Gentiana amarella L. S. P. ed. II, 334. (V. Bert. Flor. ital. p. 96, vol. III).

Gentiana campestris All. F. P. I, 97.

= Gentiana campestris L. S. P. ed. II, 334, (V. Bertol. Flor. ital. vol. 3, p. 99).

Gentiana nana All. F. P. I, 99.

= Gentiana tenella, Rottbel. Act. hafn. 10, p. 436, T. 2, f. 6 (1770).

Gentiana palustris All. F. P. I, 100.

= Swertia perennis L. S. P. 328.

Geranium palustre All. F. P. II, 36.

= Geranium sylvaticum L. S. P. 954. (V. Parlatore, Flor. it. V. 150. Circa questa sinonimia v. Burnat loc. cit. vol. II, pag. 13).

Geropogon hirsutum All. F. P. I, 229.

= Geropogon hirsutum L. S. P. Ed. II, 1109.

= Scorzonera hirsuta L. Mantiss. II, 278.

Gypsophila prostrata All. F. P. II, 78.

= Gypsophila repens L. S. P. 407.

H.

Harmala multifida All. F. P. II, 101.

= Peganum Harmala L. S. P. 548.

Hedysarum spinosissimum All. F. P. I, 323.
= Onobrychis Caput-galli Lam. Flor. franc. II, 651. (V. All. Auct. p. 21, N. 1189).
Helianthemum lunulatum All. in Gren. et Godr. Flor. Franc. 1, 175.
= Cistus lunulatus All.
Heracleum branca ursina All. F. P. II, 4.
= Heracleum Sphondylium L. S. P. 249.
Herniaria lenticulata All. F. P. II, 209.
= Herniaria alpina Vill. Flor. Delph. p. 21 (1785) et H. Plant. d. Dauph. II, 556. (Teste Allioni in Auct. F. P. p. 36).
Hesperis laciniata All. F. P. I, 271, Tab. 82, fig. 1.
= Hesperis hieracifolia Vill. Hist. Plant. Dauph. 3, p. 317 (1789).
Hesperis sylvestris All. F. P. I, 270.
= Hesperis matronalis L. S. P. 927.
* **Hibiscus laevis** All. Auct. ad Synops. (1770-73).
= Hibiscus laevis (Allioni) Scop. (1788).
= Hibiscus militaris Cav. Diss. N. 1, p. 352, Tab. 198, fig. 2 (1785-89) DC. Prodr. vol. 1, p. 451. (V. A. Gras, Nouvelles notes sur quelques rectifications de Synonymie. Bull. Soc. bot. de France, 1863.
Hieracium alpinum All. F. P. I, 212, Tab. 14, fig. 2.
= Hieracium glanduliferum Hoppe. (V. Burnat, Catalogue raisonné des Hieracium des Alpes maritimes 1883, pag. 17.
Hieracium capillaceum All. F. P. I, 214, Tab. 31, fig. 3.
= Scorzonera hirsuta L. Mant. 278.
Hieracium florentinum All. F. P. I. 213.
Hieracium glaucum All. Auct. ad Synops. p. 71, N. 70 et All. F. P. I, 214, Tab. 28, fig. 3 et Tab. 81, fig. 1. (V. Gras, loc. cit. p. 3).
Hieracium grandiflorum All. F. P. I, 217, Tab. 29, fig. 2 et 3.
= Crepis grandiflora Tausch. Bot. Zeit. 11, 1, p. 80 (1828).
Hieracium rupestre All. Auct. p. 12, Tab. 1, fig. 2.
Hieracium sabaudum All. Fl. Pedem. I, 218, tab. 27, fig. 2.
= Hieracium *vallisiacum* Fr. (sec. Arvet. Touvet.).
Hieracium sabaudum All. F. Ped. (quoad citat. Linn.).
= H. *boreale* Fries var.

Hieracium sabaudum All. (Exsiccata; continet. H. *vallesiacum* Fr. H. *boreale* Fr. H. *umbellatum* L.).

Hieracium spicatum All. F. P. I, 218, Tab. 27, fig. 1, e 3.

= Hieracium prenanthoides Vill. Prosp. p. 35 (1779). (Annuent. All. in mss.) (1).

Hieracium staticefolium All. Miscell. Taur. V. Auct. ad Synops p. 71, N. 71 (1770-73) et All. F. P. I, 214, Tab. 81, fig. 2.

= Hieracium staticifolium Vill. Prosp. p. 35 (1779). (V. Gras, loc. cit. p. 5).

Hieracium succisaefolium All. F. P. I, 215.

= Crepis succisaefolia Tausch. Bot. Zeit. 11, 1, p. 79 (1828).

Hieracium tomentosum All. F. P. I, 216.

= Hieracium lanatum Vill. Prosp. p. 35 (1779). (Annuente C. Allionus in mss.) (2).

Holcus arenarius All. Auct. p. 46.

= Koeleria villosa Pers. Syn. I, p. 97 (1779).

Hordeum europaeum All. F. P. II, 260.

= Elymus europaeus L. Mantiss. 1, p. 35. (V. Ascherson et Graebner, vol. II, p. 742, loc. cit.).

Hordeum geniculatum All. F. P. II, 259, Tab. 91, fig. 3.

= Hordeum maritimum Wither. Bot. Arr. 172 (1776).

Hyacinthus botryoides All. F. P. I, 118.

= Hyacinthus botryoides L. S. P. 318.

= Muscari botryoides. Mill. dict. N. 1.

Hyoscyamus aureus All. F. P. I, 104.

= Hyoscyamus major Mill.

Hypericum barbatum All. F. P. II, 46.

= Hypericum Richerii Vill. Prosp. p. 44.

Hypericum maculatum All. F. P. II, 45, Tab. 83, fig. 1.

= Hypericum quadrangulum L. S. P. 785 (H. delphinense Vill. Prosp. p. 44).

---

(1) V. nota pag. 48.

(2) Id.

I.

Iberis ciliata All. Auct. p. 15 (1789) et Herb.

= *Iberis Molinerii* Balb. Cat. Stirp. R. Horti Taur. anno 1813 (Confr. Colla, Elogio storico di Balbis p. XLI. V. Burnat. loc. cit. vol. I, p. 133).

Iberis garrexiana All. Auct. ad Synop. (1770-73) p. 73. F. P. I, 250, Tab. 40, fig. 3, Tab. 54, fig. 2.

= *Iberis sempervivens* L. S. P. 648 (varietas).

Iberis nana All. Auct. p. 15, Tab. 2, fig. 1 et Herb.

= Iberis aurosica Chaix in Vill. Hist. Pl. Dauph. I, 349, et III, 288, (Sec. Aut.). Burnat, loc. cit. p. 129-30-31, tiene invece separate queste due specie.

Illecebrum capitatum All. F. P. II, 210 (non L.) Sec. Bertoloni Flor. it. II, 735.

= Paronychia Kapela Kerner, var. β. serpillifolia (Burnat, loc. cit. vol. III, p. 225).

Illecebrum Paronychia All. F. P. II, 210, (non L.) sec. Bertol. Flor. ital. II, 731.

= Paronychia polygonifolia DC. Flor Franc. III, 403. (V. Burnat, loc. cit. vol. III, p. 223).

Isatis alpina All. F. P. I, 259 Tab. 86, fig. 2.

= Isatis alpina Vill. Prosp. p. 38 (1779) (V. intorno alla questione di questa sinonimia: Fauché-Prunelle, *Coup d'œil sur la végétation des environs de Briançon.* Bull. Soc. bot. de France. Tom. VII, 702, 703; 1860. — A. Gras, *Nouvelles notes sur quelques Rectifications de Synonymie.* Bull. Soc. bot. franç. 1863, p. 15 a 17).

J.

Juncus aquaticus All. F. P. II, 217.

= Juncus lamprocarpus Ehrh. Calam. n. 126.

Juncus bulbosus All. F. P. II, 215.

= Juncus compressus Jacq. En. Stirp. Vind. p. 60 et 235.

uncus luteus All. F. P. II, 216.
= Luzula lutea DC. Flor franc. 3, p. 159.
uncus spadiceus All. F. P. II, 216.
= Luzula spadicea DC. Flor. franc. 3, p. 159.
uncus spicatus All. F. P. II, 217.
= Luzula spicata DC. Flor. franc. 3, p. 161.

L.

actuca augustana All. Auct. ad Synop. p. 72, N. 74 et All. F. P. I, 224, Tab. 52, fig. 1.
= Lactuca Scariola, L. S. P. edit. II, p. 1119 (varietas sec. Koch. Flor. Germ. p. 369).
appa officinalis All. F. P. I, 145.
= Lappa major Gaertn. Fruct. 2, p. 379.
appa tomentosa All. F. P. I, 144.
= Lappa tomentosa Lam. Dict. I, p. 377.
apsana minima All. F. P. I, 206.
= Arnoseris pusilla Gaertn. Fruct. II, 355, T. 157 (1791).
aserpitium Halleri All. F. P. II, pag. 11.
= Laserpitium Halleri Vill. Prosp. p. 25 (1779).
= Laserpitium Panax Gouan Illust. 13 (1773).
athyrus Cicera All. F. P. I, 329.
= Lathyrus Cicera L. S. P. 730. (V. Moris Flor. Sardoa I, 587. — V, Burnat loc. cit. vol. II, p. 198.
athyrus coccineus All. F. P. I, 330.
= Lathyrus sphaericus Retzius. Obs. bot. fasc. 3. p. 39 (anno 1783).
avatera punctata All. Auct. p. 26.
= Lavatera biennis Guss.
avatera thuringiaca All. F. P. II, p. 42.
= Lavatera Olbia L. S. P. 972. (V. Moris, Flora Sardoa I, p. 302.
eontodon livens All. F. P. I, 210, Tab. 32, fig. 2.
= Taraxacum palustre DC. Flor. franc. IV, 45 (1815).
epidium rotundifolium All. F. P. I, 252, Tab. 55, fig. 2.

= *Thlaspi rotundifolium* Gaud. Flor. Helv. IV, 218.

Libanotis montana All. F. P. II, 90, Tab. 62.

= Athamantha Libanotis L. S. P. 351, edit. II.

= Seseli Libanotis Koch. Umb. p. 111, et Deutsch. Flor. 2, p. 411.

Ligusticum ferulaceum All. Auct. ad Synop. p. 80, N. 97 et All. F. P. II, 13, Tab. 60, fig. 1, (escluso Syn. Seguieri) — (V. Gras. loc. cit. 1861, p. 2).

Ligusticum meum All. F. P. II, 12.

= Meum athamanticum Jacq. Fl. Austr. 4, p. 2, tab. 303.

Ligusticum Mutellina All. F. P. II, 13, Tab. 60, fig. 2.

= Ligusticum Mutellina Crantz Stirp. Aust. I edit. fasc. III, 81, (1762-67).

= Meum Mutellina Gärt.

Ligusticum simplex All. F. P. II, 15, Tab. 71, fig. 2.

= Ligusticum Muttellinoides Vill. Prosp. p. 25, Tab. VIII, fig. 3.

= Laserpitium simplex L. Mantiss. 56.

= Gaya simplex Gaud.

Lindernia pyxidaria All. Miscell. Taur. vol. III, Stirp. aliquot descript. p. 178. (1762-65) et All. F. P. I, 57.

= Capraria gratioloides L. S. P. 876, ed. II.

Linum perenne All. F. P. II, 108.

= Linum alpinum L. S. P. 1672, ed. 2. β montanum Koch. (V. Koch. Synop. ed. alt. 1857, p. 111.

= L. montanum Schleicher (V. Burnat. loc. cit. vol. 1, p. 282).

Lotus cytisoides All. F. P. I, 311, Tab. 20, fig. 1.

= Lotus creticus L. S. P. ed. II, 1091. (V. Moris, Fl. Sardoa I, 507. — Burnat. loc. cit. vol. II, 149).

Lotus Dioscoridis All. F. P. I, 310, Tab. 59, Fig. 1.

= *Lotus peregrinus* L. S. P. 774, (Sec. Rchb. — V. Burnat, loc. cit. vol. II, p. 151.

Lunaria argentea All. F. P. I, 245, Tab. 54, fig. 3 et Auct. ad Synop. p. 73 (1770-73).

= Alyssum argenteum Vitman, Sum. 4, p. 30, (1790).

Lunaria halymifolia All. F. P. I, 245, Tab. 54, fig. 1, et Tab. 86, fig. 1.

= Alyssum halimifolium L. S. P. ed. II, 907, (V. Burnat, loc. cit. vol. I, p. 113).

Lythrum thymifolia All. F. P. II, 168.

= Lythrum Graefferi Ten. Flor. nap. 4, p. 256. (V. Gren. et Godr. Flor. franc. vol. 1, 594.

M.

Malva nicaensis All. F. P. II, 40.

= Malva exelsa Presl. (1822).

= Malva rotundifolia Badarò in Moretti, Bot. ital. 1826, p. 18, Sec. Bertoloni, Fl. ital. VII, 257, (V. Burnat, loc. cit. vol. II, p. 6).

Malva parviflora All. F. P. II, 40.

= Malva parviflora L. Amoen. III, 416.

Medicago arabica All. F. P. I, 315.

= Medicago polymorpha v. arabica L. S. P. 780.

= Medicago maculata Sibt. 1794. (V. Burnat, loc. cit. vol. II, 105).

Medicago hirsuta All. F. P. I, 315.

= Medicago minima Grufberg. in L. Amoen. IV, 105, anno 1759. (V. Burnat, loc. cit. pag. 109, vol. II).

Medicago intertexta All. F. P. I, 315.

= Medicago polymorpha var. intertexta L. S. P. 780.

= Medicago intertexta Gaert.

= Medicago Echinus DC. (V. Burnat. loc. cit. p. 37, vol. II).

Medicago laciniata All. F. P. 1, 316 et Auct. p. 21.

= Medicago polymorpha v. laciniata L. S. P. ed. II, 1099. (V. Burnat, loc. cit. vol. II, p. 108).

Medicago muricata All. F. P. I, 316.

= Medicago rigidula v. Gerardi, Burnat.

= Medicago Gerardi de Not. Rep. p. 104 et Herb. (V. Burnat, loc. cit. p. 101, vol. II).

Medicago orbicularis All. F. P. I, 314.

= Medicago orbicularis et marginata Wild. En. Hort. Berol. II, 801-2. (V. Burnat, loc. cit. vol. 2, p. 97).

Medicago rigidula All. F. P. I, 316.

= Medicago polymorpha var. rigidula L. S. P. ed. I, 779.

= Medicago rigidula Desr. (V. Burnat, Flor. d. Alp. marit. p. 101, vol. II).

Medicago scutellata All. F. P. I, 315.

= Medicago polymorpha var. scutellata. L. S. P. ed. I.

* **Melia sempervirens** All. Auct. ad Synop. (1770-73).

= Melia Azedarach L. β. sempervirens L. S. P. 550.

= Melia sempervirens Swartz. Flor. Ind. Occ. vol. II, pag. 737, 1800. (V. A. Gras, Nouvelles notes sur quelque Rectifications de Synonymie. Bull. Soc. bot. de France 1863).

Melica Bauhini All. Auct. p. 43, N. 2250.

= Melica amethystina Pourr. (V. Ascherson et Graebner, loc. cit vol. II, 347).

Melica minuta All. F. P. II, 254.

= Melica minuta L. Mantiss. I, 32, (1767).

Melilotus indica All. F. P. I, 308.

= Trifolium melilotus indica var. δ L. S. P. ed. II, 1077.

= Melilotus parviflora Desf. 1800. (V. Burnat, loc. cit. p. 114, v. II).

Melilotus messanensis All. F. P. I, 309.

= Trifolium messanensis L. Mant. alt. p. 255.

Melilotus officinalis var. β. All. F. P. I, 309.

= Melilotus alba Desr. in Lam. Dict. IV, 63 (1795-96) (V. Burnat, loc. cit. vol. II, p. 117, 18).

Melissa cretica All. F. P. I, 39.

= Calamintha Nepeta Link. et Hoffm. (V. Gren. et Godr. vol. II, Flor. franc. 664).

Mentha austriaca All. F. P. I, 18, Tab. 75, fig. 2.

= Mentha arvensis L. S. P. 577.

Secondo le ricerche citate del Briquet, la *M. austriaca* di All. corrisponderebbe alla: *Mentha arvensis* L. Subsp. *agrestis*. Briq. var. *Allionii* Briq. — V. Briquet, loc. cit. p. 91.

Mentha exigua All. F. P. I, 18.

= Mentha arvensis L. S. P. 577.

Nell' Erbario di Allioni sotto il nome di *M. exigua* si trovano alcune varietà di questa specie state studiate da J. Briquet, al lavoro del quale rimandiamo il lettore. — La *M. exigua* di Allioni (secondo *Briquet*) corrisponderebbe alla varietà della *Subsp. austriaca,* della specie Linneana. (V. John Briquet, Les Labiées des Alpes maritimes. Part. I, pag. 88 et seg.).

Mentha gentilis All. F. P. I, 18.

= Mentha arvensis L. S. P. 577. V. a questo riguardo Briquet. loc. cit. *M. arvensis* L. Subsp. *austriaca.*

Mespilus amelanchier All. F. P. II, 143.

= Amelanchier vulgaris Moench. Meth. p. 682 (anno 1794).

Mespilus aria All. F. P. II, 141.

= Sorbus aria Crantz. Stirp. austr. fasc. 2, p. 46 (1762).

Mespilus aucuparia All. F. P. II, 142.

= Sorbus Aucuparia L. S. P. 477.

Mespilus azarolus All. F. P. II, 141.

= Crataegus azarolus L. S. P. 477.

Mespilus Chamaemespilus All. F. P. II, 143.

= Sorbus Chamaemespilus Crantz. Stirp. Austr. ed. I, II, p. 40.

Mespilus Cotoneaster All. F. P. II, 143.

= Cotoneaster integerrima Medik. Gesch. d. Bot. p. 85, anno 1793. (V. Burnat. loc. cit. vol. III, p. 162).

Mespilus domestica All. F. P. II, 142.

= Sorbus domestica L. S. P. 477.

= Pyrus sorbus Gaertn. Fruct. II, 43, Tab. 87.

Mespilus monogyna All. F. P. II, 141.

= Crataegus monogyna Jacq. Flor. Austr. III, 50, T. 292. fig. 1, (1775).

Mespilus oxyacantha All. F. P. II, 141.

= Crataegus monogyna Jacq. (V. Moris Flor. Sard. II, 44. — Burnat loc. cit. vol. III, p. 159).

Mespilus Pyracantha All. F. P. II, 142.

= Cotoneaster Pyracantha Spach. Hist. veg. phan. II, 73.

Mespilus torminalis All. F. P. II, 141.

= Sorbus torminalis Crantz. Stirp. Austr. (1763) II, p. 45.

Myosotis nana All. Auct. ad Synops. (1770-73) p. 61, N. 31 et All. F. P. I, 54.

= Myosotis nana (N. N. Amann) in Linn. Amaenitates academicae 1759.

= Myosotis nana Vill. Prosp. p. 21, Tab. 23, fig. 2.

= Eritrichium nanum Schrad. (1820). (V. A. Gras, loc. cit. 1861 pag. 3).

Myrrhis australis All. F. P. II, 29.

= Scandix australis L. S. P. ed. II, p. 369.

Myrrhis bulbosa All. F. P. II, 29.

= Chaerophyllum bulbosum L. S. P. 258.

Myrrhis pecten-Veneris All. F. P. II, 29.

= Scandix pecten L. S. P. 256.

N.

Najas major. All. Auct. ad Synop. p. 55, N. 1 et All. F. P. II, 221.

= Najas major Roth. Tent. Flor. Germ. II, p. 499.

Najas marina (α) L. S. P. 1015 (1789).

Najas minor All. Auct. ad Synop. 2, N. 2 et All. F. P. II, 221.

= Caulinia fragilis Willd. Sp. 4, p. 182 (1798).

Narcissus tazzetta All. F. P. II, 154.

= Narcissus tazetta L. S. P. ed. II. p. 416.

Narthecium calyculatum All. F. P. II, 165.

= Anthericum calyculatum L. S. P. 311.

= Tofieldia calyculata Wahlenberg (1813).

Nepeta Nepetella All. F. P. I, 37, Tab. 2, fig. 1.

= Nepeta lanceolata Lam. Flor. franc. 3, p. 399. (V. Gren. et Godr. Flor. Franc. 2, p. 674).

O.

Onagra biennis All. F. P. I, 278.

= Oenothera biennis L. S. P. 492, ed. II.

Onobrychis saxatilis All. F. P. I, 323, Tab. 19, fig. 1.
= Onobrychis saxatilis Lamk. Flor. Franc. II, (1778). (V. Burnat, loc. cit. vol. II, p. 223 et 224).

Ononis cenisia All. F. P. I, p. 319, Tav. 10, fig. 2.
= Ononis alpina All. Auct. ad Synop. p. 77, N. 91 et Spec. Ped. pag. 49 et Tab. X, fig. 3.
= Ononis cenisia L. Mant. II, 267.

Ononis columnae All. Auct. ad Synop. 77, 90, All. F. P. I, 318, Tab. 20 fig. 3.
= Ononis subocculta Vill. Prosp. 41, (1779) Hist. Plant. Dauph. I, 255 (1786) et III, 429 (1789) — V. Burnat. loc. cit. vol. 2, p. 87-88.
= Ononis parviflora Lam.

Ononis foetens All. Auct. ad Synop. p. 77, N. 89. F. P. I, 317, Tab. 41, fig. 1.
= Ononis spinosa L. S. P. 716, (forma) Sec. Burnat. loc. cit. vol. 2, p. 83-87.

Ononis viscosa All. F. P. 1, 318.
= Ononis viscosa L. var. β breviflora Moris. Flor. Sardoa I, 415. (V. Burnat, loc. cit. vol. II, p. 81).

Onopordon rotundifolium All. F. P. I, 144, Tab. 38, fig. 1.
= Berardia subacaulis Vill. Prosp. p. 28.

Orchis alpina All. F. P. II, 149.
= Herminium alpinum Lynd.
= Chamaeorchis alpina C. L. Richard. Mém. du Muséum 4. p. 57.

Orchis antropophora All. F. P. II, 148.
= Ophrys antropophora L. S. P. 948.
= Aceras antropophora R. Brown.

Orchis monorchis All. F. P. II, 148.
= Ophrys Monorchis L. S. P. 947.
= Herminium Monorchis R. Brown.

Orchis variegata All. F. P. II, 147.
= Orchis tridentata Scop. Flor. Carn. 2, 190, ed. II, 1772.

Ornithopodium compressum All. F. P. I, 336.
= Ornithopus compressus L. S. P. 744.

Ornithopodium scorpioides All. F. P. I, 336.
= Ornithopus scorpioides L. S. P. 744.
Oxys acetosella All. F. P. II, 88.
= Oxalis acetosella L. S. P. ed. II, 318.
Oxys corniculata All. F. P. II, 89.
= Oxalis corniculata L. S. P. 623, ed. II.
Oxys stricta All. F. P. II, 89.
= Oxalis stricta L. S. P. 624, ed. II.

P.

Panicum hirtellum All. F. P. II, 240.
= Panicum undulatifolium Arduino Anim. Specim. alt. 14, Tab. 4. (1764).
= Oplismenus undulatifolius P. Beauv. (1814).
Pedicularis comosa All. F. P. 1, 64, Tab. 4, fig. 1.
= Pedicularis comosa L. S. P. ed. II, 847.
Pedicularis hirsuta All. Sp. Ped. Stirp. p. 52, Tab. 12, fig. 1 et All. F. P. I, 63, Tab. 3, fig. 1, (non Linn.).
= Pedicularis rosea Wulf. in Jacq. Collect. 2, p. 57 (1788).
= Pedicularis rosea Wulf. β Allioni Rchb. f.
Pedicularis incarnata All. F. P. I, 63, Tab. 3, fig. 2, Tab. 4, fig. 2.
= Pedicularis incarnata Jacq. Flor. austr. 2, p. 24, Tab. 140 (1774).
Pedicularis tuberosa All. F. P. I, 64.
= Pedicularis tuberosa L. S. P. ed. II, 847.
Peucedanum minus All. F. P. II, 6.
= Peucedanum carvifolia Vill. Prosp. 25, et Hist. Plant. d. Dauphin. 2, 630.
Phaca minima All. F. P. I, 338.
= Astragalus alpinus L. S. P. 760 (1753).
Phaca tragacantha All. Auct. ad Synop. p. 79. — F. P. I, 338.
= Astragalus sempervivens Lamk. (1783).
= Astragalus aristatus L'Hérit. Stirp. nov. p. 170 (anno 1784-85) (V. Burnat. loc. cit. vol. II, p. 160).

Phleum Gerardi All. F. P. II, 232.
= Alopecurus Gerardi Vill. in Flora Delphinalis 5, impressa cum vol. I, Gilibertianae editionis Linnaei Systematis plant. Europae. (1785; anteriore alla F. P. di Allioni).

Phleum Michelii All. F. P. II, 233.
= Phleum hirsutum Sut. Fl. Helv. I, 34, 1802.

Phleum viride All. F. P. II, 232.
= Phleum asperum Jacq. Coll. bot. I, 110, 1786.
= Phleum paniculatum Huds. Flor. Angl. 23, 26 (1762).

Phytheuma Halleri All. F. P. I, 116.
= Phyteuma ovatum Schmidt. (1795).
= Phyteuma urticifolium Clairvill. (1811).

Phyteuma Michelii All. F. P. I, 115, Tab. 7, fig. 3.
= Phyteuma scorzonerifolium Vill. Hist. Plant. Dauph. II, p. 519. Tab. XII, (1787).

Phyteuma pauciflorum All. F. P. I, 115.
= Phyteuma pauciflora L. S. P. Ed. II, p. 241.

Phyteuma Scheuchzeri All. Auct. ad. Synop. 63, N. 38, (1770-73) et All. F. P. I, 116, Tab. 39, fig. 2.
= Phyteuma Charmelii Vill. Flor. Delph. in Gilib. Ed. Linn. Syst. plant. (1785) et Vill. Hist. des Plant. de Dauph. 2, 516 exclus. fig. *B* et *C*.

Picris danubialis All. F. P. I, 211, Tab. 70, fig. 3.
= Leontodon hastile L. S. P. ed. 1123.

Picris hirta All. F. P. I, 210.
= Leontodon hirtum Vill. Hist. Plant. Dauph. vol. 3, p. 82 Tab. XXV.
= Leontodon Villarsii Loisel. Flor. gall. ed. 1, 514 (1806).

Picris hispida All. F. P. I, 210.
= Leontodon hispidus L. S. P. p. 1124, ed. II.
= Apargia hispida Wild. Sp. pl. 3, part. 3, p. 1552.

Picris saxatilis All. F. P. I, 211, Tab. 14, fig. 4.
= Leontodon pyrenaicus Gouan. Ill. 55, t. 22, fig. 1 et 2 (1773).

Picris taraxaci All. F. P. I, 211, Tab. 31, fig. 1.
= Leontodon taraxaci Lois. Flor. Gall. ed. I, 513 (1828).

Picris tuberosa All. F. P. I, 210.
= Leontodon tuberosum L. S. P. 799.
= Thrincia tuberosa DC.

Pimpinella pumila All. F. P. II, 18.
= Trinia vulgaris DC. Prodr. 4, p. 103.

Pisum maritimum All. F. P. I, 332 (non L.).
= Pisum elatius Marsch. Bieb. Flor. Taur. cauc. II, 151. (V. Burnat, vol. II, loc. cit. p. 191.

Plantago Bellardi All. F. P. I, 82 (Bellardi) Tab. 85, fig. 3.
= Plantago pilosa Pourr, in Mem. Ac. Toulous. III, p. 324, (1788).

Plantago serpentina All. Auct. ad Synops. 60, N. 25 (1770-73) et All. F. P. I, 82.
= Plantago serpentina Vill. Prosp. 19 et Hist. Plant. Dauph. 2. 304. (V. Gras, Not. sur quelq. Rect. de Synon. Bull. Soc. bot. franc. 1861).

Poa Cenisia All. Auct. p. 40, N. 2209.
= Poa distichophylla Gaud. Flor. Helv. I, 250 (1828).

Poa cilianensis All. F. P. II, 246, Tab. 91, fig. 2.
= Eragrostis megastachya Link. Hort. Berol. I, 187 (1827). (V. Ascherson et Graebner vol. II, loc. cit. p. 371; — V. F. Vignolo-Lutati: Sul valore della *Poa cilianensis*. Malpighia 1904).

Poa eragrostis All. F. P. II, 247.
= Eragrostis pilosa P. Beauv. Agrost. 162, (1812).

Poa Gerardi All. F. P. II, 245.
= Festuca spadicea L. S. P. ed. 12, Add. II, 732 (1767) subvar. *aurea* Hackel. (V. Ascherson et Graebner loc. cit. vol. II, p. 514).

Poa montana All. F. P. II, 245.
= Poa nemoralis L. S. P. 69 (V. Ascherson et Graebner Synops. p. 407).

Poa Sabauda All. F. P. II, 245.
= Festuca elatior Linn. Sec. Hort. Kew. vol. III, pag. 575, 1894. V. Coll. Herb. Ped. VI, p. 59, (non invenitur in Herb. All.).

Poa seslerioides All. F. P. II, 246, Tab. 91, fig. 1.
= Sesleria Pedemontana Reut. in Boiss. et Reut. pugillus 127 (1852)

Exicc. Reuter 1847. (V. Ascherson et Graebner vol. 1, loc. cit. p. 324).

Polygala monspeliaca All. F. P. I, 301.
= Polygala monspeliaca L. S. P. 702.

Polygonatum majale All. F. P. I, 130.
= Convallaria majalis L. S. P. 451.

Polygonatum multiflorum All. F. P. I, 131.
= Convallaria multiflora L. S. P. 315.

Polygonatum officinale All. F. P. I, 131.
= Convallaria Polygonatum L. S. P. 315.

Polygonatum verticillatum All. F. P. 1, 131.
= Convallaria verticillata L. S. P. 315.

Polygonum alpinum All. Auct. ad Synop. p. 94, N. 142 et All. F. P. 2. pag. 206, Tab. 68, fig. 1.

Polygonum Bellardi All. F. P. II, 207, Tab. 90, fig. 2.
= Polygonum patulum M. Bieb. Flor. Taur. Cauc. I, 304 (1808).

Polygonum strictum All. Auct. ad Synop. p. 94, N. 141 et All. F. P. II, 207, Tab. 68 fig. 1.
= Polygonum minus Huds. Flor. Angl. 1, 148 (1762).

Polypodium limbospermum (Bellardi) All. Auct. p. 49, N. 2404.
= Aspidium montanum Asch. Flor. d. Pror. Brandeb. p. 922. (V. Luerssen. loc. cit. p. 367).

Polypodium molle All. F. P. II, 287.
= Athyrium alpestre Nyland. Sec. Ledebour Flora rossica IV, 510, (Sub. Polyp. rhaetic.) v. Luerssen loc. cit. p. 144. (1853).

Polypodium Pontederae All. F. P. II, 286.
= Athyrium Filix femina Roth. var. dentatum Doell. Rhin. Flora 12 sub. Asplenio. (V. H. Christ ex. in Herb. Bellardi).

Potentilla hirta All. F. P. II, 55 Tab. 71, fig. 1.
= Potentilla hirta Linn. S. P. 497, var. β. *pedata* Koch. Synop. ed. 2, p. 237 (v. Burnat. loc. cit. vol. 2, p. 249).

Potentilla norvegica All. F. P. II, 58, (non Linn.).
= Potentilla frigida Vill. Histoire des Plantes du Dauph. III, p. 563.

Potentilla rubens All. F. P. II, 58.

= Potentilla hirta L. S. P. 497, (sensu latissimo) var. β pedata Koch. Synop. ed. 2, p. 237, (V. Burnat. loc. cit. vol. II, p. 249).

Prenanthes ramosissima All. F. P. I, 226, Tab. 33, fig. 1.

= Lactuca ramosissima Gren. et God. Flor. franc. Tom. II, p. 318. (1850) (ex descript. fig. exlus.).

Primula glutinosa All. Auct. F. P. p. 6. N. 338.*

= Primula Allionii Loisl. Notice sur les plantes à ajouter à la Flor. de France p. 38, pl. III, fig. 1, 1810. (V. Bertoloni pag. 383, Flor. it. vol. 2.

Primula hirsuta All. Auct. ad Synop. p. 62, N. 34, 1770-73, et All. F. P. I, 93.

= Primula viscosa Vill. (1779) Prosp. p. 21.

Secondo la Signora E. Widmer la *P. hirsuta* di Allioni comprenderebbe le forme indicate nel suo lavoro coi nomi di *P. viscosa* Vill. *P. Cottia* Widm. e *P. Pedemontana* Thom. (Vedi E. Widmer, Die Europäische Arten der Gattung Primula München 1891, p. 56.

Primula longiflora All. F. P. I, 92, Tab. 39, fig. 3.

Primula viscosa All. F. P. I, 93, Tab. 5, fig. 1.

= Primula hirsuta Vill. Hist. des Pl. de Dauph. II, 469.

= Primula latifolia Lap. Histoir. abrègée des Plantes des Pyrenées (1813). (V. Widmer loc. cit. p. 41).

Pteris crispa All. F. P. II, 284.

= Allosorus crispus Bernh.

Q.

Quercus aegilops All. F. P. II, 190.

= Quercus aegilops L. S. P. 996.

R.

Ranunculus agrarius All. Auct. p. 27 (1789).

= Ranunculus sardous Crantz. Stirp. austr. ed. I, fasc. II, p. 84, anno 1763.

Intorno alla storia della sinonimia di questa specie vedi il lavoro di A. Gras, Sur la Synonymie d'une espèce de Ranunculus, Bull. Soc. bot. Franç. vol. IX, 1862, p. 324 et seg. — V. pure Burnat, Flor. d. Alp. marit. p. 38, vol. I. — Il nome di *Ranunculus Philonotis* Ehrh. Beiträge II, 145 data solo dal 1788.

Ranunculus auricomus All. F. P. II, 49.

= Ranunculus auricomus L. S. P. 551.

Ranunculus Columnae All. F. P. II, 50, Tab. 67, fig. 3 e 4.

= Ranunculus Seguierii Vill. Prosp. p. 50, Tab. 32.

Ranunculus peucedanifolius All. F. P. II, 53.

= Ranunculus aquatilis L. S. P. 556.

= Ranunculus fluitans Lam F. F. 3, 164.

Ranunculus plantaginens All. F. P. II, 48, Tab. 76, fig. 1.

= Ranunculus pyrenaeus L. Mant. alt. p. 248 (var.).

Ranunculus polymorphus All. F. P. II, 49, Tab. 82, fig. 2.

= Ranunculus auricomus L. S. P. 551. (V. Burnat, loc. cit. p. 28. V. Allioni Auct. p. 27, N. 1449, dove egli stesso ammette questa sinonimia.

Rapistrum arvense All. F. P. I, 258.

= Raphanus Rhapanistrum L. S. P. 669.

Rapistrum perenne All. F. P. I, 258.

= Myagrum perenne L. S. P. 893.

= Rapistrum perenne Berg. Phytonom. III, (1784).

Rapistrum rugosum All. F. P. I, 257, Tab. 78.

= Myagrum rugosum L. S. P. 640.

= Rapistrum rugosum Bergeret Phytonom. III, 171 (anno 1784). V. Burnat. Flore des Alpes maritimes p. 150, vol. I. — Gras, Nouvelles notes sur quelques rectifications de Synonymie. Bull. Soc. bot. Franç. 1863, p. 17, Extr.

Reseda sesamoides All. F. P. II. 92, Tab. 88, fig. 3.

= Astrocarpus Clusii Gay. in Arch. fr. et alt. F. Schultz. (1842). J. Muller Monog. Resed. p. 222.

Rhagadiolus creticus All. F. P. I, 226.

= Hyoseris cretica L. S. P. 810.

= Hedypnois cretica W.

Rhagadiolus hedypnois All. F. P. I, 226.

= Hyoseris hedypnois L. S. P. 809.

Rhagadiolus radiatus All. F. P. I, 227.

= Hyoseris radiata L. S. P. 808.

Rhagadiolus scaber All. F. P. I, 226.

= Hyoseris scabra L. S. P. 809.

Rhagadiolus taraxacoides All. F. P. I, 227.

= Hyoseris taraxacoides Vill. Prosp. 33, tav. 26, fig. 3.

= Robertia taraxacoides DC.

Rhagadiolus Zacintha All. F. P. I, 227.

= Lapsana zazintha L. S. P. 1141.

= Zacyntha verrucosa Gaertn. Fruct. II, 358, Tab. 157, fig. 7.

Rorella longifolia All. F. P. II, 88.

= Drosera longifolia L. S. P. 282.

Rorella rotundifolia All. F. P. II, 88.

= Drosera rotundifolia L. S. P. 281.

Rosa foetida All. F. P. II, 138.

= Rosa foetida Herrmann Diss. p. 18, N. 13 (1770).

= Rosa Eglanteria Linn. Sp. P., p. 491 (1753).

= Rosa lutea Miller (1768) V. Burnat. loc. cit. vol. III, p. 91.

Rumex arifolius All. Auct. ad Synop. p. 94. N. 140, et All. F. P. II, 204 (non L. f.).

= Rumex montanus Poir. Dict. supp. 4. p. 323, V. A. Gras, Rectifications ecc. loc. cit. 1861.

Rumex multifidus All. F. P. II, 205.

= Rumex Thyrsoides Desf. Flor. Atl. 1, p. 321 (1798) β fissus Koch. (V. Gren. et Godr. Flor. Franc. III, 44).

Ruta graveolens minor All. F. P. I, 281.

= Ruta angustifolia Pers. (v. Burnat, loc. cit. p. 41).

Ruta legitima All. F. P. I, 280.

= Ruta montana L. S. P. 383. (V. Burnat, loc. cit. vol. II, p. 41.

S.

Salix lapponum All. F. P. II, 186.

= Salix glauca L. S. P. ed. II, 1446. (v. Ces. Pass. Gib. Comp. Flor. ital. p. 225).

Salvinia natans All. F. P. II, 289. (V. Luerssen loc. cit. pag. 600).

Sanguisorba auriculata All. F. P. I, 80.

= Sanguisorba officinalis L. S. P. 116.

Saxifraga Bellardi (Bellardi) All. F. P. II, 72, Tab. 88, fig. 1.

= Saxifraga controversa Sternb. Revis. Saxif. 43, Tab. 16, fig. 1, v. Grenier et Godr. Flor. Franc. I, 643.

= Saxifraga tridactylites var. β et γ Bert. Flor. ital. IV, 495, 96 (v. Burnat, loc. cit. vol. III, p. 241).

Saxifraga biflora All. Auct. ad Synop. 86, N. 116 et All. F. P. II, 71, Tab. 21, fig. 1.

= Saxifraga rosea Lap. (1795-1801).

Saxifraga Cotyledon All. F. P. II, 68 (p. p.)

= Saxifraga Cotyledon L. S. P. 570 (in valle Augusta Pretoria).

Saxifraga Cotyledon All. F. P. II, 68 (non L.) p. p. in valle Sturae.

= Saxifraga lingulata Bell. App. ad Flor. Ped. in Mem. Acc. Scienz. Torino X, 226, anno 1793. V. Moris, Flor. Sard. II, 147 et Burnat loc. cit. vol. III, pag. 259.

Saxifraga exarata All. F. P. II, 73, Tab. 88, fig. 2.

= Saxifraga exarata Vill. Prosp. p. 47, an. 1779.

Saxifraga hypnoides All. F. P. II, 72, Tab. 21, fig. 4.

= Saxifraga exarata Vill. Prosp. p. 47.

Saxifraga muscoides All. Auct. ad Synop. p. 87, N. 117, et All. F. P. II, 70, Tab. 61, fig. 2.

= Saxifraga planifolia Lap. Flor. Pyr. 31 (1795).

Saxifraga mutata All. Auct. N. 1518 ex loco p. 27, (non in F. P.).

= Saxifraga florulenta Moretti. Tent. ad Ill., sin. delle specie del gen. Saxifrag. in Giorn. fis. chim. di Configliacchi e Brugnatelli, vol. IV, p. 104, anno 1824. — Sec. Cesati. — (V. Burnat, loc. cit. vol. III, p. 266).

Saxifraga Pedemontana All. F. P. II, 73, Tab. **21** fig. 5, e 6.
= Saxifraga heterophylla Sternb. Rev. **Saxif.** 50, 1810, Tab. 88.
Saxifraga purpurea All. Auct. ad Synop. p. 86 (1770-73) N. 115 et All. F. P. II, 71 Tab. 21, fig. 2.
= Saxifraga retusa Gouan. Ill. p. 28, Tab. 18, fig. 1, (1773).
Scabiosa hybrida All. Auct. F. P. 9.
= Knautia hybrida Coult. Mém. sur Dips. (1823).
Scabiosa pyrenaica All. F. P. I, 140, Tab. 25, fig. 2 et Tab. 26 fig. 1.
= Scabiosa mollissima DC. Flor. Franc. V. 490.
Scabiosa transylvanica All. F. P. I, 138, Tab. 48.
= Scabiosa transylvanica L. S. P. 98.
= Cephalaria transylvanica Schrad. Cat. Sem. Hort. H. Gött. (1814).
Scirpus annuus All. F. P. II, 277.
= Fimbristylis annua Roemer et Schult, II, 95 (1817).
Scorzonera graminifolia All. F. P. I, 228.
= Scorzonera graminifolia L. S. P. 791.
= Scorzonera aristata Ram. in DC. Flor. Franc. IV, p. 922 (1805). V. Koch. Flor. Germ. p. 364.
Scrophularia auriculata All. F. P. I, 69.
= Scrophularia aquatica L. S. P. 620.
Scrophularia lucida All. F. P. I, 70.
= Scrophularia canina L. S. P. 865. (V. Bertoloni, Flor. ital. VI, p. 393).
Scutellaria Columnae All. F. P. I, 40, Tab. 84, fig. 2.
= Scutellaria pallida Guss.
Sedum aestivum All. F. P. II, 121.
= Sedum annuum L. S. P. 432.
Sedum alsinaefolium All. F. P, II, 119, Tab. 22, fig. 2, (err. Synonimia data da *Steudel.* e dall' *Index Kewensis* i quali farebbero questa specie allioniana sin. con S. Cepaea L.)
Sedum annuum All. F. P. II, 122.
= Sedum alpestre Vill. Prosp. 49.
Sedum cepaea All. F. P. II, 120.
= Sedum Cepaea L. Sp. 617.

Sedum gallioides (Pourr.) All. F. P. II, 120, Tab. 65, fig. 3.
= Sedum Cepaea L. S. P. 431.
Sedum hirsutum All. F. P. II, 122, Tab. 65, fig. 5.
Sedum nicaense All. F. P. II, 122, Tab. 90, fig. 1.
= Sempervivum sediforme Jacq. Hort. bot. Vindob. Tav. 81 (1770).
= Sedum altissimum Poir. in Encycl. IV, p. 634. (1796) (V. Ardoino Flor. d. Alp. marit. p. 144).
Sedum saxatile All. F. P. II, 121, Tab. 65. fig. 6.
= Sedum alpestre Vill. Prosp. p. 49.
Selinum argenteum All. F. P. II, p. 9.
= Peucedanum venetum Koch. Syn. ed. 1, p. 305.
Selinum imperatoria All. F. P. II, 7.
= Imperatoria ostrutium L. S. P. 371.
= Peucedanum ostrutium Koch. Umbell. 95.
Selinum Carvifolia Chabraei All. F. P. II, 9.
= Peucedanum carvifolia Vill. Prosp. p. 25.
Selinum pseudo-carvifolia All. (Crantz.) F. P. II, 9.
= Selinum Carvifolia L. S. P. 350, ed. II.
Senecio parviflorus All. F. P. I, 200 Tab. 38, fig. 3.
= Senecio incanus L. S. P. 869.
Senecio siculus All. Auct. ad Sinops. p. 70, N. 66 (1770-73).
= Senecio squalidus L. S. P. ed. II, 1218. (V. A. Gras, Nouvelles notes etc. Bull. Soc. Franç. 1863).
Senecio uniflorus All. F. P. I, 200, fig. 3, Tab. 17 (Auctarium ad Synop. p. 70, prius sub nomine Solidago uniflora).
= Inula provincialis. L. S. P. 884.
Seriola urens All. F. P. I, 230, Tab. 29, fig. 1.
= Seriola aetnensis L. S. P. Ed. II, p. 1139.
Silene Cordifolia All. F. P. II, 82, Tav. 23, fig. 3.
Silene excapa All. F. P. II, 83, Tab. 79, fig. 2.
= Silene acaulis L. var. β. excapa Avè Lallemant. De plantis quib. Italiae bor. ec. 1829 (V. Burnat, loc. cit. vol. I, p. 210).
Silene nicaensis All. Auct. ad Synop. p. 88, N. 123. — All. F. P. I, 81, Tab. 44, fig. 2.

Silene sericea All. F. P. II, 81, Tav. 79, fig. 3.
= Silene pubescens Lois. (1806).

Silene vallesia All. F. P. II, 81, Tab. 23, fig. 2.
= Silene vallesia L. S. P. ed. II, 603.

Sinapis maritima All. F. P. I, 264.
= Sisymbrium austriacum Jacq. var. genuinum Gren. et Godr. Flor. Franc. I. 95.
= Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. erysimifolium Rouy.
= Sisymbrium erysimifolium Pourr. (Valbusa pro specie) V. Burnat, loc. cit. p. 285, vol. III.

Sinapis pyrenaica All. F. P. I, 264.
= Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. Villarsii Rouy.
= Sisymbrium acutangulum DC. (Valbusa pro specie) (V. Burnat, loc. cit. vol. III, p. 285).

Sinapis recurvata All. F. P. I, 265, Tab. 87.
= *Brassica Cheiranthos* Vill. Prosp. p. 40, v. All. Auct. ad Fl. Ped. p. 17.
= *Sinapis Cheiranthus* Koch. (V. Burnat, loc. cit. p. 72).

Sinapis Tournefortii All. F. P. I, 265.
= *Brassica Cheiranthos* Vill. Prosp. p. 40, v. All. Auct. ad. Flor. Ped. p. 17.
= *Sinapis Cheiranthus* Koch. (V. Burnat, loc. cit. p. 72).

Sisymbrium barbareae (Murr.) All. Auct. p. 19.
= Barbarea praecox R. Brow. in Ait. Hort. Kew. ed. II, IV, 109, 1812 (V. Bert. Flor. italic. VII, p. 79).

Sisymbrium dentatum All. F. P. I, 275, Tab. 57, fig. 3.
= Sisymbrium pinnatifidum DC. Flor. Franc. IV, 667 (1815).
= Braya pinnatifida Koch.

Smyrnium nodiflorum All. F. P. II, 21, Tab. 72.
= Ligusticum nodiflorum Vill. Prosp. 25, Tab. XXIII, fig. 2 (1779).
= Trochiscanthes nodiflorus Koch. Umbell. p. 103, fig. 95.

* **Solanum capsicoides** All. Auct. ad Synop. (1770-73) p. 64, N. 44.
= Solanum ciliatum Lam. Ill. N. 2360 (1793).
= Solanum capsicoides Mart. in Flora XXI (1838) II, Beibl. 78. V. A. Gras, Nouvelles notes ecc. Bull. Soc. bot. Franç. 1863.

Solanum melanocerasum All. Auct. ad Synop. p. 64, N. 43 (1770-73).
= Solanum nigrum δ guineense L. S. P. ed. I, p. 186.
= Solanum guineense Mill. Dict. ed. VIII, 1768. V. A. Gras, Nouvelles Notes sur quelques Rectifications de Synonymie. Bull. Soc. bot. franç. 1863.

Sonchus asper All. F. P. I, 222.
= Sonchus asper Vill. Pl. d. Dauph. 3, 158 (1789) V. Gras. loc. cit.

Sonchus laevis All. F. P. I, 222.
= Sonchus oleraceus L. S. P. ed. 2, 1116.

Sonchus picroides All. F. P. I, 223, Tab. 16, fig. 1, et All. Stirp. Nicaens. pag. 84.
= Picridium vulgare Desf.

Spartium purgans All. F. P. I, 339 (non L.).
= Genista cinerea DC. Flor. franc. IV, 494. (V. Burnat, loc. cit. vol. II, p. 64).

Spergula saginoides All. F. P. II, 118, Tab. 64, fig. 1.
= Sagina repens Burnat in Gremli Exicc. flor. Schw. ed. 3, p. 100 (1878) V. Burnat, loc. cit. vol. I, p. 238.

Stachys heraclea All. F. P. I, 31, Tab. 84, fig. 1.
= Stachys betonicaefolia Pers. Syn.
= Stachys barbata Lap.
= Stachis phlomoides W.
= Stachis barbigera Viv.

Statice cordata All. F. P. II, 90.
= Statice pubescens DC. V. A. Gras, Bull. Soc. bot. franc. 1861, loc. cit. pag. 7 et Moris Flora Sardoa, III, 47.

Statice plantaginea All. F. P. II, 90.
= Armeria plantaginea Wild. En. Hort. Bot. Ber. 1, p. 334, 1806.

Stellaria hypericifolia All. F. P. II, 115.
= Alsine uliginosa Vill. Prosp. p. 48.
= Stellaria uliginosa Murr. Prodr. Stirp. Gött. p. 55 (1770).

Stramonium foetidum All. F. P. I, 103.
= Datura Stramonium L. S. P. 179.

Struthiopteris Filicastrum All. F. P. II, 283.

= Onoclea Struthiopteris Hoffm. Deut. Flor. II, (1795) V. Luerssen in Rabenhorst Krypt. Fl. vol. III, pag. 485.

Swertia barbata All. F. P. I, 208.

= Crepis barbata L. S. P. 805.

= Tolpis barbata Gaertn. Fruct. II, 372, Tab. 160. (1788-1807).

= Tolpis umbellata Bert. Flor. it. VIII, 541.

T.

Tamariscus gallicus All. F. P. II, 87.

= Tamarix gallica L. S. P. ed. II, 386.

Thlaspi ruderale All. F. P. I, 250.

= Lepidium ruderale L. S. P. 645.

Thymaelaea alpina All. F. P. I, 132.

= Daphne alpina L. S. P. 356.

Thymaelaea cneorum All. F. P. I, 133.

= Daphne cneorum L. S. P. 357.

Thymaelaea dioica All. Auct. pag. 9.

= Daphne dioica Gouan, Ill. p. 27, Tab. 17, fig. 1 (1773).

= Passerina dioica Ram.

Thymaelaea gnidium All. F. P. I. 133.

= Daphne Gnidium L. S. P. 357.

Thymaelaea laureola All. F. P. I, 132.

= Daphne Laureola L. S. P. 357.

Thymaelaea mezereum All. F. P. I, 131.

= Daphne Mezereum L. S. P. 356.

Thymaelaea sanamunda All. F. P. I, 132.

= Daphne Thymelea L. S. P. 356 (Passerina Thymelaea DC.).

Thymaelaea tarton-raira All. F. P. I, 133.

= Daphne Tarton-raira L. S. P. 356.

Thymus pannonicus All. F. P. I, 20.

= Thymus serpyllum. L. S. P. 590 (var.) Subsp. lanuginosus, var. lanuginosus Briquet.

Thymus piperella All. F. P. I, 21, Tab. 37, fig. 3.

= Satureja Piperella Bert. VI, 50 (non Thymus Piperella L.).

Tragus racemosus All. F. P. II, 241.

= Cenchrus racemosus L. S. P. 1049.

Trifolium apulum All. Auct. ad Synops. p. 76, N. 87.

= Trifolium spumosum L. S. P. 1085. (V. Gibelli e Belli Rivista critica ecc. 1891, Torino, p. 9).

Trifolium hirtum All. Auct. 20.

= Trifolium hispidum Desf. Flor. Atlant. p. 200, II, (1798-1800). V. Gibelli e Belli, Rivista critica della specie del Gen. Trifolium, Torino 1888, pag. 79.

Trifolium saxatile All. F. P. I, 305, Tab. 59, fig. 3 et prius All. Auct. ad Synops. 1770-73, p. 77.

= Trifolium thymiflorum Vill. Prosp. 1779, p. 43.

Triticum biunciale (Villars) Allioni Auct. p. 46 (1789).

= Triticum biunciale Vill. Pl. Dauph. II, p. 167 (1787).

= Festuca maritima L. Sp. P. 75 (1753).

= Nardurus tenellus Rchb. v. biuncialis Ascherson et Graebner loc. cit. p. 541.

Turritis bellidifolia All. F. P. I, 270, Tab. 40, fig. 1.

= Arabis bellidifolia Jacq. Obs. Bot. 1, 22, (1764-1771).

Turritis coerulea All. F. P. I, 270, Tab. 40, fig. 2.

= Arabis coerulea All. Auct. ad Synops. p. 74, N. 82 (1770-73).

Turritis stricta All. Auct. p. 18, 978.

= Arabis hirsuta Scop. Flor Carn. ed. II, 30, vol. II (1772).

= Varietas δ Allionii, Burnat, loc. cit. vol. I, pag. 99.

U.

Unifolium quadrifidum All. F. P. I, 124.

= Convallaria bifolia L. S. P. 452.

= Smilacina bifolia Desf.

= Majanthemum bifolium DC. Flor. franc. vol. 3, p. 177.

V.

Valeriana angustifolia All. F. P. I, 1.
= Centranthus angustifolius DC. Flor. Franc. IV, p. 239.
Valeriana dentata All. F. P. I, 2.
= Valerianella dentata Pollich.
= Valerianella Morisonii DC. Prod. IV, p. 627.
Valeriana saliunca All. F. P. I, 3, Tav. 70, fig. 1.
= Valeriana Celtica Vill. Hist. Pl. Dauph. vol. II, 1787).
Verbascum orientale All. F. P. I, 106.
= Celsia orientalis L. S. P. 621.
Verbascum phlomoides All. F. P. I, 105.
= Verbascum Boerhavii L. Mant. 45.
Verbascum thapsoides All. F. P. I, 105.
= Verbascum phlomoides L. S. P. 235. (V. Gren. et Godr. Flor. Franc. p. 549, vol. 2).
Veronica Bellardi All. F. P. I, 77.
= Veronica verna L. S. P. 14 (Sec. Specimina Bellardiana). (V. Bert. Flor. ital. vol. I, p. 96).
Veronica praecox All. Auct. Flor. Ped. p. 5, Tab. 1, fig. 1.
= Veronica romana Scop. Flor. Carn. ed. II, Tom. I, p. 18. 1772. (V. Koch. Flor. Germ. p. 459.)
Veronica pumila All. F. P. I, 75, Tab. 22, fig. 5 et Allioni Specim. Ped. Stirp. p. 19, Tab. III, fig. 3.
= Veronica alpina L. S. P. 11.
Veronica pyrenaica All. F. P. I, 73, Tab. 46, fig. 3.
= Veronica Allionii Vill. Prosp. 20.
Veronica repens All. Specim. Pedemont. p. 21, Tab. 4, fig. 3.
= Veronica pyrenaica All. F. P. I, 73, Tab. 46, fig. 3 (Teste Allioni).
= Veronica Allioni Vill. Prospect. p. 20 (1779).
Veronica romana All. F. P. I, 79, Tab. 85, fig. 2.
= Veronica verna L. S. P. 14.

Questa sinonimia fu riconosciuta da G. B. Moris, v. Flor. Sard. Tom. III pag. 227. — *Bertoloni* (1833), *Koch* (1857), anteriori a questo autore avevano ritenuta la specie di Allioni sinonima a *V. triphyllos* L.

Veronica succulenta All. F. P. I, 78, Tab. 22, fig. 4.
= Veronica verna L. S. P. 19.

Veronica tenella All. F. P. I, 75, Tab. 22, fig. 1.
= Veronica serpyllifolia L. S. P. 12. β. tenella Gren. et Godr. Flor. Franc. 2, p. 594.

Vicia angustifolia All. F. P. I, 325.
= Vicia lathyroides All. F. P. I, 326, Tab. 59, fig. 2.
= Vicia angustifolia L. Amoen. IV, 105 (1759).
= Vicia sativa L. v. Bobarti, Burnat, loc. cit. vol. II, p. 172, (V. Daydon Jackson, journ. of. Botany, an. 1887, p. 181).

Viola alpina All. F. P. II, 98, et Herb. non Jacq.
= Viola Valderia All. Fl. Ped. II, 98, Tab. 24, fig. 3. (V. Burnat, loc. cit. p. 176, vol. I).

Viola cenisia All. F. P. II, 98, Tab. 22, fig. 6 et Spec. Ped. p. 14, Tab. III, fig. 4.
= Viola cenisia L. S. P. ed. II. 1325.

Viola nummularifolia All. F. P. II, 98, Tab. 9, fig. 4 et All. Spec. Ped. Stirp. p. 7, Tab. II.
= Viola nummulariaefolia Vill. Prosp. p. 26 (1779).

Viola pinnata All. F. P. II, 97.
= Viola acaulis ecc. All. Miscell. Taurin. vol. III, 1766).
= Viola pinnata L. S. P. 1323 ed. II.

Viola Ruppii All. F. P. II, 99, Tab. 26, fig. 6 et All. Auct. ad Synops. p. 84, N. 109.
= Viola canina L. S. P. 935, var. β Ruppii Sec. Burnat loc. cit. p. 172, vol. I.

Violae species caninae proxima All. Auct. F. P. p. 29, N. 1645.*
= Viola arenaria DC. Flor. Franc. IV, 1805, p. 806. (Viola Allioni Pio 1813) (V. Burnat. loc. cit. vol. I, p. 171).

Viola Valderia All. F. P. II, 98, Tab. 24, fig. 3 et Herb.; All. Auct. 29.
= Viola alpina All. F. P. II, 98 et Herb. non Jacquin!
= Viola cenisia var. β. Bertoloni II, Flor. ital. 710, V. Burnat, loc. cit. p. 175, et seg.

GENERA ET SPECIES ALLIONIO DICATAE

quae nomen Clarissimi botanici pedemontani memorant.

GENERA [1].

Allionia Loefling. Iter hisp. 181, 1758, Linn. Syst. Edit. X, 890, 1759 (Nictagineae).
= Wedelia Loefl. Iter 180 (1758).

SPECIES.

A.

Allionia incarnata L. S. P. ed. II, 147.
= Wedelia incarnata Loefl. Iter 180.

Andropogon Allionii Lam. DC. Flor. Franc. III, 97 (1805).
= Andropogon contortus L. S. P. 1045 (1753).

Anthyllis vulneraria var. *Allionii* DC. Prodr. II. p. 170.
= Anthyllis vulnerarioides Bonjean (in Schedulis Herb. sub. nom. Anthillis nova) in Rchb. Flor. excur. N. 3313.
= Astragalus vulnerarioides All. F. P. (V. Burnat, Flor. d. Alp. marit. II, p. 91).

Arabis Allionii DC. Flor. franc. IV, p. 676.
= Turritis stricta All. Auct. p. 18.
= Arabis hirsuta Scop. var. δ Allionii Burnat, Flor. d. Alp. marit. vol. I, p. 99.

Artemisia Allionii DC. in Nyman Consp. p. 377, N. 19.

---

(1) Il Buniva nella sua biografia allioniana ricorda come: *Fabricius donna le nom d'Allioniana à une espèce de Pyralis, et Loefling donna aussi le nom d'Allionia a une autre espèce de Plante* V. Allionia. — Oggi il *Satyrus Allionii* F. è sin. di *S. Statilinus* Hnfn. V. Staudinger, Catalog. 1871). Ricorda il Bonino (loc. cit.) che anche il *De Pruner salutò col nome di Allionia* una specie del genere *Phalaena*.

= Artemisia nana Gaud. Flor. Helv. 5, p. 231, variet. β. Allionii, DC. Prodr. vol. VI, p. 98.

Asperula Allionii Baumg. Enumerat. stirp. ec. I, 80, 1816-46.

= Asperula hexaphylla All. F. P. I, 12, Tab. 77, fig. 3.

B.

Brachypodium Allionii Presl. Flor. Sic. I, 5 XLV, 1826.

= Brachypodium ramosum Roemer et Schultz. Syst. II, 737 (1817). V. Ascherson et Graebner vol. II, p. 637.

Brassica Allioni Moretti, Ind. Sem. Hort. Taur. 1829 (fide DC. sched.).

= Brassica Oleracea (V. Index Kewensis vol. I, p. 334).

Questa indicazione è errata; poichè la specie fu dal Moretti pubblicata in: *Delectus Seminum Horti botanici Universitatis* **Ticinensis** e non *Taurinensis*. La *Brassica Allionii* corrisponde alla *Brassica Oleracea* All. Auct. p. 17, N. 766 (non Linn.) e sarebbe sinonima di Brassica Balearica. Badarò Pl. lig. occ. in Botanico Italiano, N. 12 (non Pers.).

C.

Campanula Allionii Lapey. Hist. Abregée des Plantes des Pyrenées, Tom. I, p. 107.

= Campanula Allionii Vill. Prosp. p. 22.

= Campanula alpestris All. loc. cit.

Campanula Allionii Vill. Prosp. p. 22, 1779.

= Campanula alpestris All. Rar. Ped. Spec. 1755, p. 36 Tab. VI, et Auctarium ad Synops. p. 63, 1770-73.

Cerinthe minor β Allionei Fiori Flor. analit. d'Italia vol. II, p. 362.

= Cerinthe maculata All.

= Cerinthe minor. L. (non maculata All.) V. G. Gola, Osservazioni sulla *Cerinthe maculata* All. Malpighia, 1904.

Cirsium Allionii Thur. in Schaed. V. Ardoino, Flor. des Alpes marit. pag. 198.

= Cirsium pyrenaicum All. F. P. I, p. 151, Tab. 12.

= Cirsium rivulare Link. β Allionii (Thur.) in Arcang. Flor. ital. Edit. II, p. 725.

Cirsium Allionii Spenner Flor. friburgensis ecc. 1825-29, 1079.

= Cirsium acaule All. F. P. I, p. 153 (Sec. Gren. Godr. Flor. Franc. 2, p. 224).

D.

Dianthus Allionii Colla Herb. Pedem. Tom. I, p. 297, 1833.

= Dianthus atrorubens All. F. P. II, 75 et. Herb.

H.

Helianthemum Allionii Tineo. Plant. Rar. Siciliae, fasc. 2, p. 43.

= Helianthemum canum Dunal in DC. Prodr. I, p. 277.

= *Cistus canus* All. F. P. II, p. 103 et Herb. Sec. Moris, Flora Sardoa, I, 202.

Heteropogon Allionii Roem. et Schultz. Syst. veget. II, 835 (1817).

= Andropogon contortus L. S. P. 1045 (1753).

Hieracium Allionii Hall. fils. in Roemer Arch. I, II, 2.

= *Crepis alpestris* Sec. Steudel loc. cit. et Index Kewensis loc. cit.

Questa specie secondo Gaudin Flor. Helv. 5, pag. 66 sarebbe sinonima di *Hieracium alpinum* L. Gaudin però la ritiene *inedita*. Egli ricorda pure un'altro *Hieracium Allioni* Schl. exs. senza dare altre indicazioni.

Hieracium Allioni Mérat, in Steudel Nom. vol. I, 761.

= *Hieracium glaucum* All. (?)

Hieracium Allioniii Monn. Ess. p. 15.

= Hieracium glaucum All. F. P. I, p. 214, Tab. 28, fig. 3 et All. Auct. ad Synop. 1770-73, p. 71. (Sec. Koch. Syn. ed. III, p. 386).

= Hieracium saxatile Vill. (Sec. Index Kewensis 1, 1149 et Steudel Nom. I, 761).

Hieracium Allionii Tausch. in Flora XI. 1828, I, Ergr. 58.

= *Hieracium cymosum* (Secund. Stendel Nom. 1, p. 761 et Index Kewensis vol. I, p. 1149).

L.

Lotus Allionii Desv. journ. bot. 3, p. 77, 1814.
= Lotus cytisoides L. S. P. 776.

M.

Mentha arvensis L. S. P. 577.
= Supsp. agrestis var. *Allionii* Briquet (V. John Briquet, Les Labiées des Alpes maritimes p. 91).

O.

Onobrychis Allionii Jourdan, Hort. Gratianop. 1851, V. Walp. Ann. bot. syst. IV, 546.
= Onobrychis saxatilis All. non Lam. (V. Burnat. loc. cit. vol. II, pag. 224).

P.

Pedicularis Allionii Rchb. Ic. Flor. Germ. et Helv. vol. XX, 1862, p. 77, Tab. 1760.
= Pedicularis rosea Wulf, β Allionii Rchb. f.
= Pedicularis hirsuta All. Sp. Ped. Stirp. p. 52, Tab. 12, fig. 1 et All. F. P. I, 63, Tab. 3, fig. 1 (non L.).

Plagius Allionii L'Héritier! mss. in DC. Prodr. VI, p. 135.
= Chrysanthemum discoideum All. F. P. I, p. 190, Tab. 11, fig. 2.
= Plagius virgatus DC. Prodr. VI, p. 135.

Primula Allionii Koch. p. 678 (Hausm.).
= Primula tirolensis Schott. E. Widmer, Die Europaische Arten da Gattung-Primula München 1891, p. 64.

Primula Allionii Loisl. Notice sur les Plantes à ajouter à la Flor. de France, p. 38, pl. III. fig. 1, 1810, V. E. Widmer loc. cit. p. 62.

R.

Rosa Allionii Burnat et Gremli, Supplem. à la Monographie des Roses des Alp. marit., p. 16 et Burnat, Flore des Alpes maritimes, vol. III, 1899, p. 81 e 311.

Rumex Allioni Link. Handb. I, 306.

= Rumex montanus Desf. (V. Index Kewensis fasc. IV, 1895.

S.

Saxifraga Allioni Baumg. Enum. Stirp. Trans. I, 378.

= Saxifraga Pedemontana All. F. P. II, 73, Sec. Steudel. Nom. II. 518, et Index Kewensis vol. IV, p. 812.

= Saxifraga cymosa W. K. (V. Burnat, loc. cit. vol. III, p. 247.

Saxifraga Allionii Gaud. Flor. Helv. 3, p. 126.

= Saxifraga exarata All. (non Vill.) sec. Gaud. loc. cit.

= Saxifraga muscoides Wulf. in Jacq. Miscell. 2, p. 125 (1762).

Saxifraga Allionii A. Terr. Bull. Soc. bot. ital. 1892, p. 135.

= Saxifraga Pedemontana. All. (V. Burnat, loc. cit. p. 247, vol. III).

Sinapis Allionii Jacq. Hort. Vind. 2. t. 168, Boissier Flor. or. II, 395.

= Sinapis arvensis L. var. Allionii Aschers. et Schweinf. V. Illustration de la Flore d'Égypte, Le Caire, 1887.

Sinapis Allionii var. turgida Boissier, Flor. orient. Tom. I, p. 395.

= Sinapis arvensis var. turgida (Del.) Ascherson et Schweinfurth, Illustration de la Flore d'Égypte p. 41.

V.

Veronica Allionii Schmidt. Franz. W. Flor. boemica I, 6.

= Veronica officinalis L. (Sec. Steudel Nom. II, 756 et Index Kewensis vol. IV, p. 1187).

Veronica Allionii Smith. in Trans. of the Linn. Soc, I. p. 189.

= *Veronica pyrenaica* All. (Bert. Flor. ital. 1, p. 67).

Veronica Allionii Vill, Prosp. 20 (1779).

= Veronica pyrenaica All. F. P. I, 73. Tab. 46, fig. 3.

Viola Allioni J. B. Pio, De Viola, Specimen bot. med. Taur. 1813.

= Viola Allionii Röm. et Schultz. Syst. veg. V, p. 367 1819.

= Viola Balbis Re Flor. Segusina.

= Viola arenaria DC. Flor. Franc. IV, 1805, p. 806.

CATALOGUS SPECIERUM ALLIONIO

falsae adscriptarum, quae in operibus ejus non reperiuntur.

1. — *Hieracium saxetanum* All. V. Cesati, Passerini e Gibelli, Compendio della Flora italiana.
2. — *Saxifraga columnaris* All. V. Steudel, Nomenclator botanicus, vol. II, p. 519. Hortus Kew (ex Steudel.) vol. IV, p. 813.
3. — *Ranunculus tauriensis* All. V. Steudel. loc. cit. pag. 436 et 435. Hortus Kewens. (ex Steudel.) Vol. IV. p. 689.
4. — *Galeopsis hirsuta* All. in Steudel. Nomenclator. vol. I, p. 655.
5. — *Solanum niveum* All. V. Vitman, Summa Plantarum Tom. I, p. 492. *Fulgenzio Vitman* nel citato lavoro ricorda questa specie allioniana come sinonima di *Solanum marginatum* L. fil. Suppl. 147 e aggiunge l'indicazione *Auct. Misc. Taur.* — Dunal nella Monografia del Genere Solanum (De Candolle Prodr. XIII, 370) riferisce lui pure « *fide Vitman* » questa sinonimia.

   A. Gras che si interessò dell'argomento nel lavoro, già da noi più volte ricordato (Nouvelles notes sur quelques Rectifications de Synonymie. Bull. Soc. bot. Franç. 1863) così si esprime, parlando appunto dal *Solanum* ricordato da Vitman: « *Or cette dénomination specifique n'existe nulle part dans le travail d'Allioni, et n'est probablement que l'effet d'une distraction du bon Père Fulgence Vitman* ».

   Noi che abbiamo, per questo riguardo, esaminate non solo le opere di Allioni, ma anche l'Erbario suo, concordiamo col Gras nell'attestare che nelle sue opere stampate manca qualsiasi accenno alla specie, la quale però esiste in due esemplari in Erbario col nome di *Solanum niveum* Nob., scritto di pugno di Allioni. — Ora que-

sti sono esemplari di *Solanum marginatum* L. fil. ciò che indicherebbe avere il Vitman esaminato l'Erbario di Allioni. — Sta di fatto che la specie non fu pubblicata. — Dagli esemplari dell'Erbario Torinese risulta che il *Solanum niveum* All. era coltivato nel R. Orto botanico di Torino negli anni 1792 e 1802.

6. — *Euphorbia cuneifolia* All. V. Steudel. Nom. Vol. I, 611. Il nome di questa specie che Steudel enumera fra quelle dubbie « *nec rite cognita* » non fu da noi rinvenuta, nè nelle opere stampate, nè nell'Erbario di Allioni, nè ancora nella *Florula Corsica* di Felice Valle dove pure la pianta avrebbe dovuto essere registrata; poichè, secondo Steudel, apparterrebbe alla Corsica.

7. — *Alectorolophus villosus* All. in Steudel. Nom. vol. II, p. 448 (sub Rhinanthus). — Questo nome devesi evidentemente ad un errore tipografico; poichè a pag. 48 del vol. I al nome di *Alectorolophus villosus* fa seguito *Autor*, in luogo di *All.* Del resto in nessuna delle opere allioniane è ricordata questa specie.

8. — *Cucubalus rotundifolius* All. Steudel. Nom. vol. 1, pag. 451. — Questa specie che sarebbe, secondo lo Steudel, sinonima di *Silene inflata* Sm. e che l'*Index Kewensis* (vol. I, p. 663) ricorda senza il nome di All. manca assolutamente nelle opere del nostro Autore.

9. — *Cucurbita bononiensis* All. in Steudel, Nom. I, ed. II, p. 452 et ibi sub *Planta dubia nec rite cognita,* manca nelle opere e nell'Erbario di Allioni ed è ricordata come la precedente nell'*Index Kewensis* vol. I, p. 665.

Estratto dal MALPIGHIA, *anno XVIII, Vol. XVIII.*

F. FERRERO fot. NEBIOLO - Torino